2018年度军队文职考试《医学类-护理学》（网友回忆版）

一、单项选择。从以下四个选项中选择最佳选项

1 可以使大腿后伸的肌肉是（ ）。

A、臀大肌 B、臀中肌 C、梨状肌 D、阔筋膜张肌

2 关于奇静脉的叙述，正确的是（ ）。

A、注入头臂静脉 B、注入上腔静脉
C、起自左腰升静脉 D、收集胸廓内静脉的血液

3 汇入胸导管的淋巴来源于（ ）。

A、左上半身的淋巴 B、右下半身的淋巴 C、右上半身的淋巴 D、左下半身的淋巴

4 兴奋在神经+肌肉接头传导时，乙酰胆碱递质与受体结合引发的终板电位变化是（ ）。

A、对 $Na+$、$K+$通透性增加，发生超极化
B、对$Na+$、$K+$通透性增加，发生去极化

C、仅对$K+$通透性增加，发生超极化
D、仅对$Ca2+$通透性增加，发生去极化

5 压缩性骨折最常发生于（ ）。

A、腓骨头 B、股骨头 C、椎体 D、腕舟壮骨

6 某疟疾患者突然畏寒、寒战，体温$39°C$，此时体温的变化是由于（ ）。

A、散热中枢兴奋 B、产热中枢兴奋
C、体温调节功能障碍 D、调定点上调

7 属于病理性肥大的是（ ）。

A、妊娠期子宫肥大 B、长期体力劳动者的心室肥大
C、高血压引起的心肌肥大 D、运动员肌肉肥大

8 大量细菌毒素入血，引起全身中毒症状，但血培养阴性者成为（ ）。

A、菌血症 B、病毒血症 C、毒血症 D、败血症

9 慢性炎症灶内最常见的炎细胞是（ ）。

A、中性粒细胞 B、淋巴细胞 C、嗜酸性粒细胞 D、多核巨细胞

10 病变或其进一步发展与肉芽组织无关的是（ ）。

A、十二指肠溃疡 B、血肿 C、静脉石 D、肝脓肿

11 含有三个胚层组织成分的生殖细胞肿瘤称为（ ）。

A、间叶瘤 B、错构瘤 C、畸胎瘤 D、炎性假瘤

12 急性感染性心内膜炎的瓣膜赘生物中不具有的成分是（ ）。

A、大量中性细胞 B、大量细菌菌落 C、纤维蛋白 D、大量肉芽组织

13 在采集病史时，避免使用医学术语提问，下列选项不正确的是（ ）。

A、你是否有过过敏性鼻炎 B、你是否有过鼻痒、打喷嚏
C、你是否有过咳嗽、咳痰 D、你是否有过头晕、头疼

14 患者、男性、19岁，突发脐周疼痛，呈进行性加重并逐渐转至右下腹，伴恶心、呕吐，右下腹局部压痛。最有可能诊断是（ ）。

A、急性阑尾炎 B、急性胆囊炎 C、胆结石 D、急性胃穿孔

15 患者严重代谢性酸中毒，常出现的呼吸类型为（ ）。

A、间停呼吸 B、Cheyne—Stokes呼吸

C、Bioys呼吸　　D、Kussmaul呼吸

16 患者有明显双下肢水肿伴胸腹水表现，可排除的疾病是（　）。

A、晚期肝硬化　　B、布加氏综合征　　C、肾病综合征　　D、席汉综合征

17 引起肺动脉瓣第二心音增强的疾病是（　）。

A、肺动脉瓣狭窄　　B、肺动脉瓣关闭不全
C、二尖瓣狭窄　　D、高血压

18 一般采用（　）检查直肠膀胱窝及盆腔内脏器。

A、截石位　　B、右侧卧位　　C、肘膝位　　D、左侧卧位

19 心律失常最致命的是（　）。

A、多源性频发室性早搏　　B、阵发性室性心动过速
C、阵发性室上性心动过速　　D、心室颤动

20 患者，男性，35岁，从海南旅游回家不久突起剧烈腹泻，水样便，每10分钟至半小时1次，量多，经医院诊断为霍乱。查体：腹部叩诊呈鼓音，腱反射消失，心电图Q—T时限延长，并出现U波，根据查体和心电图检查可诊断为（　）。

A、低血钠　　B、高血钾　　C、高血钠　　D、低血钾

21 周围型肺癌的发生部位是（　）。

A、支气管　　B、肺叶支气管　　C、肺段支气管以下　　D、支气管树

22 关于睾丸的描述正确的是（　）。

A、外形似蚕豆　　B、内侧邻接附睾
C、睾丸间质是产生精子的部位　　D、后缘有血管、神经和淋巴管出入

23 沙眼易发生在（　）。

A、球结膜　　B、角膜　　C、睑结膜　　D、眼睑

24 关于突触传递的描述，错误的是（　）。

A、具有延搁效应　　B、易疲劳
C、双向性　　D、通过递质传递信号

25 患者，男性，20岁，贫血3年，伴有下肢慢性溃疡，化验为正细胞贫血，血清铁460ug/L，总铁结合力210ug/L，骨髓贮存铁（++），应诊断为（　）。

A、再生障碍性贫血　　B、慢性感染性贫血
C、营养性巨幼细胞性贫血　　D、缺铁性贫血

26 成年人中心静脉压的正常值是（　）。

A、5-12mmH_2O　　B、5-12cmH_2O
C、5-12mmHg　　D、5-12Kpa

27 下列为含有B族维生素的辅酶，例外的是（　）。

A、磷酸吡哆醛　　B、辅酶A　　C、细胞色素C　　D、四氢叶酸

28 患者，男性，10岁，3天前受凉后突然寒战，高热，咳嗽，气促，胸片右上大片实变影，血气分析，pH7.46，$PaCO_2$31mmHg，BE0.4mmol/L，SB22mmol/L，$PaO_2$66mmHg。，应诊断为（　）。

A、呼吸性酸中毒
B、代谢性碱中毒
C、呼吸性碱中毒+代谢性酸中毒
D、呼吸性碱中毒

29 糖皮质激素的作用广泛而复杂，叙述正确的是（　）。

A、促进葡萄糖的利用　　B、促进脂肪的分解
C、促进肌肉组织蛋白质分解　　D、减少红细胞和淋巴细胞的数目

30 常发生细胞水肿的器官是（　）。

A、胃、肝、脾　　B、心、肝、肾　　C、心、肠、胃　　D、胃、肾、肝

31 下列器官发生梗死时对肌体的影响较小的是（　）。

A、心　　B、脑　　C、肾　　D、肠

32 B型慢性萎缩性胃炎好发于（　）。

A、贲门部　　B、胃底　　C、胃体　　D、胃窦

33 患者，男性，36岁，肝硬化腹水，尿少，四肢浮肿，心率125次/分，呼吸40次/分，端坐，有脐疝，治疗中首选（　）。

A、西地兰静注　　B、双氢克尿噻口服　　C、放腹水　　D、口服甘露醇

34 患者，男性，35岁，病程2个月，轻度乏力，腹胀，皮肤瘙痒，粪便颜色变浅。肝肋下触50px，梗阻性黄疸化验结果，肝胆B超未见肿瘤、结石，肝外胆管无扩张，应诊断为（　）。

A、梗阻性黄疸　　B、胆汁性肝硬化　　C、慢性活动性肝炎　　D、淤胆型肝炎

35 关于霍奇金淋巴瘤的叙述，不正确的是（　）。

A、肿瘤原发于淋巴结　　B、肿瘤细胞为R-S细胞
C、病变组织中有各种炎细胞存在　　D、病变后期可发生白血病转化

36 患者，男性，18岁，活动时突感右胸部撕裂样痛，查体：大汗淋漓惊恐状，气促，气管左偏，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失。最可能的诊断是（　）。

A、胸腔积液　　B、大叶性肺炎　　C、干性胸膜炎　　D、右侧张力性气胸

37 患者，男性，一个月前因外伤手术输血800ml,近一周出现乏力，食欲不振，尿色加深，化验肝功500U/L，抗HCV（+），HCV PCR（+），抗HBc（+），诊断应考虑（　）。

A、急性丙型肝炎　　B、慢性丙型肝炎
C、乙、丙型肝炎病毒合并感染　　D、急性乙、丙型肝炎

38 生命价值论是（　）统一的理论。

A、美德论与义务论　　B、生命神圣与人道论
C、生命质量与生命价值　　D、生命神圣与生命价值

39 关于医术与医德之间关系的理解，不正确的是（　）。

A、“医乃仁术”　　B、有能力做的就应该去做
C、“大医精诚”　　D、临床医学决策同时也是伦理决策

40 根据传染病防治法，应按甲类传染病管理的是（　）。

A、传染性非典型肺炎　　B、肺炭疽
C、艾滋病　　D、鼠疫

41 病人床上洗发过程中，突然出现面色苍白、出冷汗，应该立即（　）。

A、通知医生　　B、停止操作
C、加快动作完成洗发　　D、鼓励患者坚持片刻

42 病人类风湿性关节炎入院，医嘱阿司匹林口服，护士在指导患者饭后服用阿司匹林的目的（　）。

A、提高药物疗效　　B、减轻对胃肠道的刺激
C、降低药物毒性　　D、减少对肝脏的损害

43 患者呼吸由浅慢到深快到浅慢，暂停30s，周而复始，这个呼吸叫做（　）。

A、间断呼吸　　B、潮式呼吸　　C、叹息样呼吸　　D、库斯呼吸

44 对于上消化道出血，（血压很低）患者应该立即（　）。

A、紧急胃镜检查以明确诊断　　B、建立静脉通路
C、立即转送上级医院　　D、去甲肾上腺素胃内滴注

45 高血压病，为其测量血压时正确的做法是（　）。

A、缓慢放气，速度4mmHg/s
B、听到第一声响即为舒张压

C、若采取立位测量，手臂应平第六肋间
D、放气时听到的最强音即为收缩压

46 慢性胃炎病人健康教育，哪项正确（ ）。

A、只要好了，就可以随便吃　　B、可以进食辛辣食物
C、硫糖铝应在餐后服用　　D、定时定量进食，细嚼慢咽

47 肝性脑病前驱期的表现（ ）。

A、性格和行为失常　　B、昏睡　　C、扑翼样震颤　　D、脑电图异常

48 皮下注射普通胰岛素起效时间（ ）。

A、0.5-1h　　B、2-3h
C、立即起效　　D、20-30min

49 以下不属于休克早期的表现（ ）。

A、脉搏细速　　B、面色苍白、发绀　　C、血压下降　　D、尿量减少

50 病人输入库存血会引起哪种电解质紊乱（ ）。

A、低血钾　　B、高血钾　　C、高血钠　　D、低血钙

51 病人车祸导致闭合性腹部损伤，护士判断有无空腔脏器损伤的依据（ ）。

A、腹部压痛　　B、腹膜刺激征　　C、腹部损伤程度　　D、腹部外部特征

52 患者被铁钉扎伤，送入医院应该，为了预防破伤风应该（ ）。

A、注射大剂量抗生素　　B、注射破伤风抗毒素
C、注射破伤风类毒素　　D、注射大剂量青霉素

53 嵌顿性肠梗阻和绞窄性肠梗阻最主要的区别（ ）。

A、肠内容物有无血液循环障碍　　B、肠管壁有无血运障碍
C、梗阻的严重程度不同　　D、梗阻的时间

54 患者手术后4日，发热，伤口处红肿，考虑患者出现了（ ）。

A、切口感染　　B、外科手术吸收热　　C、切口裂开　　D、切口内有血肿

55 护士获取资料的最佳来源（ ）。

A、阅读病历及健康记录　　B、病人家属的陈述
C、观察及体检获取　　D、阅读病例及健康资料

56 下肢静脉曲张患者鼓励病人下床活动的目的（ ）。

A、避免深静脉血栓形成　　B、避免皮肤压疮
C、避免下肢肌肉萎缩　　D、避免泌尿系统感染

57 骨折现场急救，错误的是（ ）。

A、开放性骨折应现场复位　　B、取清洁布类包扎伤口
C、就地取材，固定伤肢　　D、平托法搬移脊柱骨折病人

58 颅中窝骨折脑脊液耳漏时，禁忌外耳道堵塞和冲洗的目的是（ ）。

A、预防颅内水肿　　B、避免脑疝形成　　C、减少脑脊液外漏　　D、预防颅内感染

59 患者脑梗塞导致右侧瘫痪，护士在测血压时，应测（ ）。

A、左侧上肢　　B、左侧下肢　　C、右侧上肢　　D、右侧下肢

60 心脏复苏首选药物（ ）。

A、肾上腺素　　B、异丙肾上腺素　　C、利多卡因　　D、糖皮质激素

(一)

患者女性，急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房。

61 病房护士应为患者安置的体位是（ ）。

A、仰卧屈膝位6小时　　B、去枕平卧6小时
C、侧卧位6小时　　D、中凹卧位6小时

62　术后第二天患者体温$38.2^{\circ}C$，并诉切口疼痛，此时护士应为患者安置的体位是（　）。

A、头高足低位　　B、仰卧屈膝位　　C、半坐卧位　　D、端坐位

63　安置该体位的目的是（　）。

A、可减少局部出血，利于切口愈合
B、有利于增进食欲，为进食作准备
C、有利于减少回心血量，减轻心脏负担
D、可使感染局限，减轻切口缝合处的张力，缓解疼痛

(二)

患者突然突然晕倒，考虑出现心搏骤停。

64　判断心搏骤停的依据（　）。

A、心音消失　　B、呼吸断续　　C、大动脉搏动消失　　D、面色苍白

65　此时应做如何处置（　）。

A、立即给心肺复苏加电除颤
B、冰袋降温，严密监测生命体征的变化
C、建立2条静脉通路，进行快速给药
D、开胸，及早进行胸内心脏按压

66　复苏的有效指征（　）。

A、神经反射不明显
B、上肢收缩压在8kPa（60mmHg）以上
C、可触及大动脉搏动
D、瞳孔由小变大

(三)

患者车祸损伤，大出血，血压75/60mmHg，心率100次/分，皮肤出现瘀点瘀斑.

67　对于此病人的护理措施（　）。

A、保持呼吸道通畅　　B、立即建立静脉通路积极补充血容量
C、应用血管收缩剂　　D、纠正酸中毒

68　此时，病人处于休克哪一时期（　）。

A、休克早期　　B、休克失代偿期　　C、休克晚期　　D、未发生休克

(四)

患者损伤胸壁，严重呼吸困难，皮下气肿，伤口处有嘶嘶声。

69　首要的护理问题（　）。

A、营养失调　　B、有感染的危险　　C、呼吸形态改变　　D、活动无耐力

70　护士应采取的急救措施（　）。

A、心肺复苏　　B、用油纱布按压封闭伤口
C、解除窒息　　D、控制出血