2020年军队文职统一考试《专业科目》医学类—护理学试题（考生回忆版）

一、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

1 HIV感染人体后可引起获得性免疫缺陷，其主要的靶细胞是（ ）。

A、$CD4^+$T淋巴细胞　　B、$CD8^+$T淋巴细胞
C、B淋巴细胞　　D、浆细胞

2 城镇发现甲类传染病，责任疫情报告人向发病地的卫生防疫机构的报告时间为发现后（ ）。

A、2小时内　　B、6小时内　　C、8小时内　　D、24小时内

3 上肢的解剖学方位术语“内侧”又称为（ ）。

A、桡侧　　B、胫侧　　C、尺侧　　D、远侧

4 肌细胞收缩的基本功能单位是（ ）。

A、肌原纤维　　B、肌小节　　C、肌丝　　D、肌管

5 下列符合麻疹出疹期临床特征的是（ ）。

A、发热的1～2天出疹，出疹同时有发热
B、发热的1～2天，热退后出疹
C、发热的2～3天出疹，出疹同时有发热
D、发热的3～4天出疹，出疹高峰期可出现高热，重者高达$40^{\circ}C$

6 心动周期指的是（ ）。

A、心音活动周期　　B、心脏电活动周期
C、心脏机械活动周期　　D、室内压变化周期

7 下列措施可以增强人体对病原体特异性免疫力的是（ ）。

A、体育锻炼　　B、调节饮食　　C、良好的卫生习惯　　D、预防接种

8 下列肌肉可调节晶状体曲度的是（ ）。

A、内直肌　　B、睫状肌　　C、瞳孔括约肌　　D、瞳孔开大肌

9 流行性腮腺炎合并胰腺炎，下列检查有助于诊断胰腺炎的是（ ）。

A、血常规　　B、血清转氨酶　　C、血清淀粉酶　　D、血清脂肪酶

10 下列不属于医学伦理原则的是（ ）。

A、有利与不伤害原则　　B、公正与公益原则
C、克己与利他原则　　D、尊重与自主原则

11 下列文件与人体实验有关的是（ ）。

A、《夏威夷宣言》　　B、《赫尔辛基宣言》
C、《希波克拉底誓言》　　D、《东京宣言》

12 传染病的医学观察时限取决于疾病的（ ）。

A、传染期　　B、恢复期　　C、临床症状期　　D、潜伏期

13 人体血液中生长激素分泌水平最高的状态是在（ ）。

A、觉醒时　　B、困倦时　　C、熟睡时　　D、饥饿时

14 生理状态下，胃黏膜可以抵抗胃液的消化作用，下列机制正确的是（ ）。

A、黏液—碳酸氢盐屏障的作用
B、胃液中的内因子对胃黏膜有保护作用
C、胃液中的糖蛋白可中和胃酸
D、胃液中不含有可消化胃黏膜的酶

15 十二指肠大乳头位于十二指肠（ ）。

A、升部 B、降部内侧 C、降部外侧 D、水平部

16 下列关系中最能反映医患关系性质的是（ ）。

A、信托关系 B、主动—被动关系 C、商品关系 D、陌生人关系

17 下列不属于人体基本组织的是（ ）。

A、骨组织 B、结缔组织 C、上皮组织 D、神经组织

18 关于医德良心，下列说法不正确的是（ ）。

A、医德良心是对道德情感的深化
B、医德良心在医疗行为前具有选择作用
C、医德良心在医疗行为中具有监督作用
D、医德良心在医疗行为后具有自我评价作用

19 在医疗活动中发生医疗事故争议时，医务人员应当立即向（ ）。

A、所在科室负责人报告
B、所在医院医务部门报告
C、所在医疗机构医疗质量监控部门报告
D、当地卫生行政机关报告

20 下列属于《传染病防治法》中规定的乙类传染病但按照甲类上报的是（ ）。

A、甲型肝炎 B、乙型肝炎
C、AIDS D、新型冠状病毒肺炎

21 肉眼观察肾体积明显缩小，质地变硬，表面有大的不规则凹陷性瘢痕，该病变最可能见于（ ）。

A、慢性肾小球肾炎 B、慢性肾盂肾炎
C、良性高血压病所致肾病变 D、急性弥漫性增生性肾小球肾炎

22 Virchow淋巴结指的是（ ）。

A、腋窝淋巴结 B、腹股沟淋巴结
C、左侧锁骨上淋巴结 D、右侧锁骨上淋巴结

23 肛裂“三联征”指的是（ ）。

A、内痔，外痔，肛裂 B、肛裂，前哨痔，肛乳头肥大
C、肛裂，前哨痔，外痔 D、肛裂，内痔，前哨痔

24 胸骨左缘第二肋间触及连续性震颤提示（ ）。

A、肺动脉瓣狭窄 B、动脉导管未闭 C、房间隔缺损 D、室间隔缺损

25 正常肺部叩诊音为（ ）。

A、鼓音 B、浊音 C、实音 D、清音

26 结肠癌患者最早出现的症状或体征是（ ）。

A、腹部肿块 B、全身症状如出血、消瘦、低热等
C、排便习惯和粪便性状的改变 D、肠梗阻症状

27 下列关于鼓室壁的描述正确的是（ ）。

A、内侧壁即迷路壁 B、外侧壁为颈静脉壁
C、前壁为鼓膜 D、岬位于外侧壁

28 患者意识大部分丧失，无自主运动，对声、光刺激无反应，对疼痛刺激尚可出现痛苦的表情或肢体退缩等防御反应，角膜反射、瞳孔对光反射、眼球运动、吞咽反射等可存在，患者意识障碍的程度是（ ）。

A、嗜睡 B、昏睡 C、轻度昏迷 D、深度昏述

29 下列血管直接起自主动脉弓的是（ ）。

A、右侧锁骨下动脉 B、左侧锁骨下动脉 C、冠状动脉 D、右侧颈总动脉

30 细胞膜内外正常Na^+和K^+浓度差的形成与维持依赖于（ ）。

A、细胞膜在静息时对Na^+的高通透性
B、Na^+和K^+的易化扩散
C、细胞膜上钠-钾泵的作用
D、细胞膜在静息时对K^+的高通透性

31 下列肝硬化病变中属于其特征性病变的是（ ）。

A、假小叶形成　　B、炎细胞浸润　　C、肝细胞坏死　　D、肝细胞水肿

32 患者，男性，50岁，诉畏寒，高热2天，咳大量恶臭痰，痰液静置后分为三层，可能的诊断是（ ）。

A、肺脓肿　　B、肺癌　　C、肺结核　　D、肺气肿

33 关于胸膜腔的描述正确的是（ ）。

A、左侧与右侧胸膜腔互相交通
B、正常双侧胸膜腔正压维持纵隔位置居中
C、胸膜腔由脏层胸膜与壁层胸膜围成
D、胸膜腔内含有大量浆液

34 骨与关节结核最常发生于（ ）。

A、肘关节　　B、肩关节　　C、膝关节　　D、脊柱

35 决定血型类型的特异物质是（ ）。

A、红细胞膜上凝集素　　B、红细胞膜上凝集原
C、红细胞膜上受体　　D、血浆中凝集原

36 感染寄生虫后，局部浸润的主要炎细胞类型是（ ）。

A、淋巴细胞　　B、单核细胞　　C、中性粒细胞　　D、嗜酸性粒细胞

37 关于男性尿道，下列说法不正确的是（ ）。

A、自然悬垂时有两个弯曲，分别是耻骨上弯和耻骨下弯
B、有三个狭窄
C、有排尿和排精功能
D、有三个膨大

38 可以发生出血性梗死的人体器官是（ ）。

A、心，肠　　B、肾，肠　　C、肾，心　　D、肺，肠

39 管理舌前$\frac{2}{3}$味觉的神经是（ ）。

A、舌下神经　　B、三叉神经　　C、面神经　　D、舌咽神经

40 下列不属于皮下及肌肉囊虫病特点的是（ ）。

A、皮下结节与周围组织有明显粘连
B、数量由数个至数百个不等
C、多分布于躯干及头部
D、皮下结节直径$0.5cm \sim 1.0cm$

41 国际红十字会每两年颁发一次南丁格尔奖，我国从1983年开始至今获得南丁格尔奖章的军队护理人员人数是（ ）。

A、$<$10人　　B、10～25人
C、26～35人　　D、$>$35人

42 可引起左心室前负荷过重的疾病是（ ）。

A、高血压　　B、主动脉瓣狭窄
C、主动脉瓣关闭不全　　D、肺动脉高压

43 代谢性酸中毒最典型的症状是（ ）。

A、呼吸深快，呼气时有酮味　　B、呼吸浅慢，呼气时有烂苹果气味

C、中枢神经系统呈兴奋状态　　D、心率减慢，血压升高

44 最常见的血液病病人出血的原因与机制是（　）。

A、意外碰撞或切割伤　　B、血小板数目减少
C、毛细血管脆性或通透性增加　　D、血浆中凝血因子缺乏

45 患者大便呈陶土色，考虑其可能的疾病是（　）。

A、消化不良　　B、梗阻性黄疸　　C、阿米巴痢疾　　D、消化道出血

46 持续性心房颤动的常见并发症是（　）。

A、阿 - 斯综合征　　B、完全性房室传导阻滞
C、肺炎　　D、栓塞

47 乳腺癌患者患侧乳腺皮肤出现“酒窝征”的原因是（　）。

A、癌瘤侵犯Cooper韧带　　B、癌瘤侵犯乳管
C、癌瘤与皮肤粘连　　D、癌瘤与胸大肌粘连

48 忌用脂肪类食物的毒物中毒是（　）。

A、酸性物质中毒　　B、碱性物中毒　　C、磷化锌中毒　　D、氰化物中毒

49 易产生剪切力的体位是（　）。

A、仰卧位　　B、半坐卧位　　C、头高足低位　　D、头低足高位

50 在抗击新冠肺炎疫情过程中，已经明确不易杀灭新型冠状病毒的消毒剂是（　）。

A、75%酒精　　B、含氯消毒剂
C、氯己定
D、过氧乙酸

51 护士在查房时发现一名创伤性休克病人的全身皮肤有出血点和瘀斑，伤口及注射部位出血，应考虑其合并了（　）。

A、ARF　　B、肝衰竭　　C、心力衰竭　　D、DIC

52 患者，女性，49岁，正常查体时发现空腹血糖$6.5mmol/L$，需要进一步做的检查是（　）。

A、OGTT试验　　B、糖化血红蛋白测定
C、血酮体测定　　D、尿糖测定

53 发生张力性气胸时，首要的急救处理措施是（　）。

A、气管插管辅助呼吸　　B、剖胸探查
C、立即排气，降低胸膜腔内压力　　D、气管切开辅助呼吸

54 对误服强酸的患者进行洗胃时应（　）。

A、用弱碱液洗胃　　B、用温水洗胃
C、用活性炭悬液洗胃　　D、往胃内灌入蛋清水

55 护士在为肝功能不全的患者做口腔护理时，发现其有肝臭味，提示患者可能是（　）。

A、肝功能逐渐好转　　B、肝昏迷前兆
C、消化不良　　D、合并其他腹腔疾病

56 关于肾病综合征的治疗，下列说法不正确的是（　）。

A、只要血肌酐不升高，应给予高蛋白饮食
B、水肿者应限水、限盐
C、可用ACEI制剂减少尿蛋白
D、可用免疫抑制剂加激素联合治疗

57 休克发生的病理生理基础是（　）。

A、心功能不全　　B、DIC
C、有效循环血量锐减和组织灌注不足　　D、多系统器官功能障碍或衰竭

58 在实施交谈收集资料的方法过程中不正确的是（　）。

A、让患者畅所欲言，切忌打断话题　　B、告知交谈的目的及所需的时间
C、注意倾听，及时给患者反馈　　D、选择适宜的交谈环境

59　足底使用冷疗可引起（　）。

A、腹泻　　B、反射性心率减慢
C、一过性冠状动脉收缩　　D、房室传导阻滞

60　判断患者服用的抗凝药物用量是否合适，应注意评估的指标是（　）。

A、凝血酶原时间　　B、血清钾浓度　　C、出入量　　D、血小板

(一)

患者，男性，42岁，进食不洁食物后出现上腹疼痛、恶心、呕吐、腹泻，诊断以“急性胃肠炎”收入院。护士评估：体温$38.4°C$，呕吐物为食物，带有黏液，粪便呈水样。请根据病例回答下列问题：

61　下列收集的资料中，属于主观资料的是（　）。

A、体温$38.4°C$
B、上腹部痉挛性疼痛2小时
C、呕吐物有酸臭味
D、24小时排便10余次

62　对该患者做出的护理诊断中，描述正确的是（　）。

A、排便异常：腹泻，与饮食不当有关　　B、食欲下降：与呕吐有关
C、急性胃肠炎：恶心、呕吐、腹泻　　D、肠鸣音亢进：与腹泻有关

63　下列为该患者实施的护理措施中不妥的是（　）。

A、嘱患者卧床休息
B、嘱患者适量饮水
C、嘱患者进食高热量饮食补充机体消耗
D、嘱患者进食清淡流质饮食

(二)

患者，女性，71岁，因患糖尿病5年，咳嗽伴发热1周，神志不清5小时入院，查体：体温$38.5°C$，脉搏120次/分，呼吸24次/分，血压$110/80mmHg$。浅昏迷，皮肤干燥。实验室检查：白细胞$12\times10^9/L$，血糖$31.2mmol/L$，尿酮（$++$），pH值7.1，血尿素氮$25mmol/L$。

请根据病例回答下列问题：

64　此时对患者的最佳治疗措施是（　）。

A、立即补充5%碳酸氢钠注射液
B、补液原则为先慢后快
C、补液加小剂量胰岛素
D、立即皮下注射胰岛素

65　抢救过程中，下列饮食护理措施中最佳的是（　）。

A、坚持给予糖尿病普通饮食
B、计算全天热量，分别以补液和鼻饲途径补充
C、暂禁食
D、经胃管间断鼻饲流质饮食

66　患者经治疗后意识恢复，血糖迅速降至正常范围，1小时后又进入昏迷状态，推测最可能发生的情况是（　）。

A、低血糖昏迷　　B、碱中毒昏迷　　C、脑水肿　　D、反应性高血糖症

(三)

手术损伤可导致病人防御能力下降，并且可能出现多种并发症。请回答下列问题：

67　手术后病人的护理重点不包括（　）。

A、防治并发症　　B、减少痛苦与不适　　C、促进术后康复　　D、做好出院准备

68 术后病人回病房时，护士应了解的术中情况不包括（ ）。

A、手术主刀医生姓名
B、手术方式和麻醉类型
C、手术过程是否顺利
D、术中出血、输血、补液情况

69 术后引流管护理不正确的是（ ）。

A、保持引流通畅
B、观察引流液颜色、性状
C、准确记录引流量
D、每日更换引流管

70 正确的术后体位护理措施是（ ）。

A、颅脑术后病人可取$30^\circ \sim 45^\circ$头高脚低位
B、腹部术后病人可取$30^\circ \sim 45^\circ$头高脚低位
C、脊柱术后病人可取斜坡卧位
D、颈、胸手术后病人多采用高半坐卧位

二、多项选择题。每小题后的四个备选答案中有两个或两个以上符合题意的答案。

71 患者的基本需要包括（ ）。

A、生理的需要
B、安全的需要
C、归属与爱的需要
D、尊重的需要
E、自我实现的需要

72 促进呼吸系统感染病人有效排痰的护理措施包括（ ）。

A、指导病人深呼吸和有效咳嗽
B、气道湿化
C、胸背部叩击
D、体位引流
E、机械吸痰

73 下列不适合癫痫患者参加的工作或活动有（ ）。

A、驾驶
B、打太极拳
C、游泳
D、高空作业
E、登高

74 吸气性呼吸困难的“三凹征”表现为（ ）。

A、胸骨上窝凹陷
B、锁骨上窝凹陷
C、剑突下凹陷
D、腹部凹陷
E、肋间隙凹陷

75 下列属于护患关系共同参与型模式特点的有（ ）。

A、主要适用于重病初愈的病人
B、主要适用于慢性病病人
C、护患双方共同参与护理措施的实施
D、护士处于主导地位，但病人有一定的主动性
E、护患双方具有基本相等的主动权和权利

76 脉压增大常见于（ ）。

A、心包积液
B、甲状腺功能亢进
C、主动脉硬化
D、主动脉瓣关闭不全
E、动静脉瘘

77 患者，男性，25岁。10天前左臂被铁钉刺伤，当时只进行了简单的处理。1天前，患者突然出现咀嚼困难、苦笑面容，收住院治疗，为该患者提供的正确护理措施是（ ）。

A、无需执行隔离措施
B、制造声音以刺激患者感官
C、使用约束带，防止坠床
D、使用冬眠药物，使患者进入昏迷状态
E、有呼吸道梗阻时，立即配合医生行紧急气管切开

78 下列对胃癌癌前病变病人进行的健康教育内容正确的有（ ）。

A、注意饮食卫生
B、告知病人及家属胃癌发生的有关因素
C、积极治疗原发病

D、定期随访并进行胃镜及X线检查
E、饮食要低热量、限蛋白、少量多餐

79 医院的基本饮食包括（ ）。

A、普通饮食 B、低盐饮食 C、软质饮食 D、半流质饮食
E、流质饮食

80 下列针对下肢静脉曲张病人的健康教育内容正确的有（ ）。

A、术后病人坚持长期使用弹力袜
B、避免久站、久坐，坐时双膝勿交叉过久
C、进行适当运动
D、有计划减肥
E、休息时抬高患肢

（四）

患者，男性，70岁，主诉腹胀、腹痛，未排便4天，触诊腹部较硬实且紧张，可触及包块，肛诊可触及粪块，医嘱予以大量不保留灌肠1次，请根据病例回答下列问题：

81 患者在液体灌入$100ml$时感觉腹胀并有便意，此时正确的护理措施有（ ）。

A、嘱患者张口深呼吸，放松腹部肌肉 B、降低灌肠筒的高度以减慢流速
C、可暂停片刻再灌入 D、停止灌肠
E、报告医生

82 灌肠中如果患者出现脉速、面色苍白、出冷汗、剧烈腹痛、心慌气促，正确的处理方式有（ ）。

A、减慢灌肠速度 B、降低灌肠筒的高度
C、立即停止灌肠 D、报告医生，给予及时处理
E、观察处理的效果

83 为帮助患者有效预防便秘，对其进行健康教育的内容正确的有（ ）。

A、指导患者每天在固定的时间段排便
B、不随意使用缓泻剂
C、多摄取可促进排便的食物和饮料
D、必须保证每日液体摄入量不少于2000ml
E、进行规律的活动锻炼

（五）

患者，男性，50岁。突发性头痛3小时，伴呕吐，以“蛛网膜下腔出血”入院。查体：体温$37.5°C$，血压$140/80mmHg$，颈抵抗，Kernig征（+），请根据病例回答下列问题：

84 该患者可能的护理诊断包括（ ）。

A、体液过多 B、焦虑、恐惧
C、疼痛：头痛 D、潜在并发症：再出血
E、知识缺乏

85 关于该疾病正确的描述包括（ ）。

A、CT是确诊蛛网膜下腔出血敏感且安全的首选方法
B、常见并发症为再出血和迟发血管性痉挛
C、老年患者症状典型
D、大动脉瘤破裂可在短时间内死亡
E、患者需要绝对卧床休息1周

（六）

男，40岁，糖尿病病史。长期胰岛素治疗。

86 患者常有注射部位（ ）。

A、上臂三角肌下缘 B、足背 C、背部 D、大腿外侧
E、两侧腹壁

87　出院对患者进行胰岛素笔注射的健康教育正确的措施（　）。

A、不可在发炎、瘢痕处注射
B、注射时针尖与皮肤呈90度
C、无需抽回血
D、更换注射部位
E、注射区域无需消毒

(七)

男，48岁，诊断为肝门静脉高压。

88　典型病理生理变化（　）。

A、发热
B、脾大
C、腹泻
D、食管下段静脉淤血
E、腹水

89　实验室检查结果（　）。

A、白细胞计数下降　B、血小板计数升高　C、白蛋白降低　D、球蛋白升高
E、白球比例倒置

90　急性大出血，三腔两囊止血正确的是（　）。

A、每隔24小时放10min
B、对三腔两囊管充分固定
C、一般压迫3~4天
D、加强巡视防止出现意外
E、心理护理