2025年军队文职统一考试《专业科目》护理学试卷（网友回忆版）

一. 医学基础综合：每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

1.（判断题）正常肺部的叩诊音为清音。（　）

2.（判断题）医患双方信息不对等是导致医患沟通不顺畅的原因之一。（　）

3.（判断题）男性患者导尿时需将阴茎向上提起，此时尿道的耻骨下弯因变直而消失。（　）

4.（判断题）保护受试者原则是人体实验最重要、最核心的伦理原则。（　）

5.（判断题）滤泡性淋巴瘤是成人最常见的非霍奇金淋巴瘤类型。（　）

6.（判断题）基础代谢率指人体正常情况下的最低代谢率。（　）

7.（判断题）濒死状态可表现为双侧瞳孔散大、对光反射消失。（　）

8.（判断题）在我国，供精人工受精只能从持有国务院卫生健康主管部门批准证书的人类精子库获得精源。（　）

9.（判断题）亚急性甲状腺炎又称桥本甲状腺炎，是一种自身免疫性疾病。（　）

10.（判断题）依据我国《献血法》，无偿献血者，若获得了有关单位给予的补贴，则不能获得无偿献血证书。（　）

11.关于单纯二尖瓣狭窄的描述，正确的是（　）

A.早期X线影像即可呈“梨形心”　　B.早期左心房可出现代偿性扩张肥大

C.心尖区可闻及收期隆隆样杂音　　D.左心房失代偿后可出现左心室扩张

12.下列指标中可以更好的反映气道通畅程度，测定气道有无阻力的是（　）。

A.用力肺活量　　B.肺通气量　　C.潮气量　　D.深吸气量

13.下列选项中属于淋巴器官的是（　）。

A.扁桃体　　B.胸导管　　C.乳糜池　　D.肠干

14.在人际沟通中准确获取信息、促进对话、向对方表达尊重，建立良好关系的核心技能是（　）。

A.语气亲切平缓　　B.多用开放式提问　　C.营造乐观语境　　D.多倾听

15.葡萄糖在近端肾小管上皮细胞的重吸收方式是（　）。

A.单纯扩散　　B.易化扩散　　C.主动转运　　D.膜泡运输

16.下列疾病中，由凋亡不足或缺乏的是（　）。

A.亨廷顿舞蹈病　　B.帕金森病　　C.阿尔茨海默病　　D.肺癌

17.患儿在医院治疗期间突发呼吸困难须立即行气管切开术，但旁边无监护人陪伴。医师最恰当的处置措施是（　）。

A.等待患儿监护人到场，获得其同意后立即行气管切开术

B.将情况报告所在科室负责人，获得其批准后立即行气管切开术

C.将情况报告所在医疗机构负责人，获得其批准后立即行气管切开术

D.将情况报告当地卫生健康主管部门获得批准后立即行气管切开术

18.下列疾病中，较少引起咯血的是（　）。

A.支气管肺癌　　B.干酪性肺炎　　C.支气管扩张　　D.急性血行播散型肺结核

19.人体最长的肌是（　）。

A.股四头肌　　B.缝匠肌　　C.肱二头肌　　D.胸大肌

20.《希波克拉底誓言》明确提出并阐明了“为病家谋利益”的行医信条，这体现了医学伦理原则中（　）。

A.尊重原则　　B.不伤害原则　　C.有利原则　　D.公正原则

21.动脉粥样硬化继发血栓形成的主要原因是（　）。

A.动脉内膜损伤　　B.血脂升高　　C.血液凝固性增高　　D.血流缓慢

22.依据我国《医师法》，国家实行医师定期考核制度，对考核不合格的医师，县级以上人民政府卫生健康主管部门应当（　）。

A.吊销其医师执业证书　　B.注销注册，废止其医师执业证书

C.对其处一万元以上三万元以下的罚款　　D.责令其暂停执业活动三个月至六个月

23.关于膀胱癌的描述，错误的是（　）。

A.常呈乳头状或息肉状　　B.好发部位是膀胱前壁

C.最常见症状是无痛性血尿　　D.部分肿瘤的发生与9号染色体缺失有关

24.患者，男性。58岁，突发剧烈头痛，脑膜刺激征为阳性，脑脊液检查为血性，压力增高。最可能的诊断为（　）。

A.偏头痛　　B.脑梗死　　C.脑膜瘤　　D.蛛网膜下腔出血

25.导致夜盲的主要原因是（　）长期摄入不足。

A.维生素C　　B.维生素B6　　C.维生素A　　D.维生素E

26.关于医患沟通含义的描述，错误的是（　）。

A.医和患均有广义与狭义之分

B.沟通的核心内涵是人与人相互理解，相互信任

C.广义医患沟通是指医疗机构的每次医疗服务活动

D.医患沟通时要以患者为中心，以医方为主导，将医学与人文相结合

27.对涉及人的生物医学研究进行伦理审查时，伦理委员会作出决定应当得到伦理委员会全体委员（　）以上同意。

A.二分之一　　B.三分之二　　C.四分之三　　D.五分之四

28.胸部查体示胸廓前后径明显增加，肋间隙增宽且饱满，此胸廓外形为（　）。

A.漏斗胸　　B.扁平胸　　C.桶状胸　　D.鸡胸

29.在静息状态下，细胞膜对（　）通透性最大。

A. K^+

B. Na^+

C. Ca^{2+}

D. Cl^-

30.“仰卧起坐”动作的完成主要依赖于（　）收缩。

A.髂腰肌　　B.股四头肌　　C.斜方肌　　D.阔筋膜张肌

31.关于躯体性腹痛特点的描述，错误的是（　）。

A.疼痛剧烈而持续　　B.定位准确，可在腹部一侧

C.可有局部腹肌强直　　D.疼痛与体位变化无关

32.关于外周血中性粒细胞核左移的描述正确的是（　）。

A.外周血非分叶核中性粒细胞百分率增高

B.外周血中性粒细胞的细胞核出现5叶或更多分叶

C.主要见于巨幼细胞贫血及造血功能衰竭

D.细菌感染引起的粒细胞类白血病反应不会出现极度核左移

33.根据我国国家突发公共卫生事件应急预案，属于较大的突发公共卫生事件的是（　）。

A.一次食物中毒人数30～99人，未出现死亡病例　　B.一次食物中毒人数超过100人或出现死亡病例
C.一次发生急性职业中毒9人以下，未出现死亡病例　　D.一次发生急性职业中毒50人以上或死亡5人以上

34.关于肾解剖位置的描述正确的是（　）。
A.左肾上约平第10胸椎体上缘　　B.右肾上缘平第12胸椎体下缘
C.第12肋穿过左肾后面上部　　D.肾门约在第一腰椎椎体

35.潜水员深海潜水时因装备突发故障急性上浮，出现呼吸困难、肌肉疼痛。最可能发生了（　）。
A.弥漫性血管内凝血　　B.减压病　　C.急性呼吸窘迫综合征　　D.静脉血栓形成

36.某人的肺通气量为6300ml/min，呼吸频率为15次/min，无效通气量为140ml。每分钟肺血流量为4.2L，则通气血流比值是（　）。
A.0.7　　B.0.8　　C.0.9　　D.1.0

37.行阑尾切除术时见阑尾高度肿胀呈蓝绿色，与周围正常组织边界不清。该病变组织最可能发生了（　）。
A.脂肪坏死　　B.纤维素样坏死　　C.湿性坏疽　　D.干酪样坏死

38.下列消化液中不含消化酶的是（　）。
A.唾液　　B.胆汁　　C.胃液　　D.胰液

39.咽部感染继发中耳炎时，病原体最可能通过（　）侵入鼓室。
A.咽鼓管　　B.扁桃体上窝　　C.外耳道　　D.梨状隐窝

40.下列器官中，手术时不用切开腹膜腔的是（　）。
A.肝　　B.肾　　C.胃　　D.脾

二. 护理专业知识：单选：每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。 多选：每小题后的五个备选答案中有两个或两个以上符合题意的答案，多选、错选或不选均不得分。

41.关于整体护理的特征描述最准确的是（　）。
A.以系统方法论为指导　　B.以医患合作和护患合作为核心
C.以护理岗位胜任力为目标　　D.护士是主动的思想者、决策者

42.5月12日是国际护士会，该日期是（　）。
A.南丁格尔的生日　　B.南丁格尔创办第一所护士学校的日期
C.南丁格尔接受英国政府奖励的日期　　D.南丁格尔奖宣布设立的日期

43.突然大量呕吐常引起（　）。
A.低渗性缺水　　B.高渗性缺水　　C.等渗性缺水　　D.高钾血症

44.关于无菌技术的表述正确的是（　）。
A.为避免微生物繁殖影响无菌操作，应在打扫完操作室后立即进行无菌操作
B.取放无菌物品时，操作者应面向无菌区域
C.取出的无菌物品有效期为4小时，若未使用，应放回无菌容器内保存使用
D.无菌操作时，操作者双臂应保持在双耳以下、腰部以上的视野范围内

45.按照马斯洛需次层次理论，对新入院高热患者应首先满足的需要是（　）。
A.体温降至正常　　B.防止跌倒坠床　　C.家属陪伴　　D.护士礼仪

46.患者、女性，45岁。孕39周，急产分娩一名女婴，产后患者突发呛咳，呼吸急促，血压急剧下降，继而昏迷。最可能的诊断是（　）。
A.羊水栓塞　　B.产后大出血　　C.子宫破裂　　D.过敏性休克

47.充血性心力衰竭伴严重水肿，应选的饮食类型是（　）。
A.低蛋白饮食　B.低脂饮食　C.低钙饮食　D.无盐低钠饮食

48.传染病在人群中持续传播的关键因素不包括（　）。
A.传染源持续存在及其排出病原体的能力　B.病原体在环境中的存活时间及其传播效率
C.医疗机构的应急响应能力及其治疗措施的先进性　D.易感人群的免疫状态及人口流动性

49.关于早产儿的生理特点描述正确的是（　）。
A.呼吸中枢发育不成熟，呼吸深快　B.常出现心率缓慢，血压较足月儿低
C.各种消化酶不足，对碳水化合物的吸收量差　D.吞咽反射较弱

50.关于子痫患者的急救护理措施，最恰当的是（　）。
A.遵医嘱给予硫酸镁治疗，控制子痫引起的抽搐　B.给予心理护理，促进心理成长
C.常规给予利尿药物　D.立即终止妊娠，保证患者安全

51.社区获得性肺炎最常见的病原体是（　）。
A.金黄色葡萄球菌　B.流感嗜血杆菌　C.肺炎链球菌　D.铜绿假单胞菌

52.消化性溃疡患者服用弱碱性抗酸药的正确方法是（　）。
A.饭前一小时服用　B.饭前半小时服用　C.服用片剂时应吞服　D.避免与奶制品同时服用

53.缓解输尿管结石引起的疼痛最有效的方法是（　）。
A.大量饮水　B.应用抗生素　C.解痉止痛　D.跳跃运动

54.患者，男性，35岁，因交通事故致脾破裂，出现口渴、尿少，查体，脉搏110次/分，收缩压80mmHg，表情淡漠，皮肤黏膜苍白。估计其失血量为（　）。
A.300～500ml　B.500～800ml　C.800～1600ml　D.1600ml以上

55.患者，男性，33岁，约10分钟前右胸被轿车撞击，出现呼吸困难。烦躁不安，大汗淋漓，口唇发绀。查体，右侧胸部饱满，颈胸部皮下气肿，气管偏向健侧，胸部叩诊呈鼓音，呼吸音消失，最可能的诊断是（　）。
A.闭合性气胸　B.开放性气胸　C.张力性气胸　D.多根多处肋骨骨折

56.慢性阻塞性肺疾病患者出现呼吸困难伴低氧血症。其氧疗原则是（　）。
A.高浓度、高流量持续吸氧　B.高浓度、高流量间断吸氧
C.低浓度、低流量间断吸氧　D.低浓度、低流量持续吸氧

57.诱发小儿高热惊厥最常见的疾病是（　）。
A.消化道感染　B.上呼吸道感染　C.败血症　D.泌尿道感染

58.使用中国新九分法估算人体烧伤面积，错误的是（　）。
A.头颈部约占全身体表总面积的9%
B.躯干约占全身体表总面积的27%
C.双下肢约占全身体表总面积的46%
D.成年女性的双臂和双足共约占全身体表总面积的9%

59.脑血管疾病术后最危险的并发症（　）。
A.发热　B.脑脊液漏　C.颅内出血　D.感染

60.患者测量口温时不慎咬破水银体温计，应立即清除口腔内的玻璃碎屑和残留物，并给予（　）。
A.大量饮水以促进汞的排泄　B.口腔消毒，防止感染
C.催吐和洗胃，加快汞的排出　D.口服蛋清或牛奶，保护消化道黏膜并延缓汞的吸收

61.慢性肾功能衰竭最常见、最早期的表现是（　）。
A.食欲不振　B.高血压　C.气促　D.贫血

62.关于肠内营养的描述，恰当的是（　）。
A.对需长期肠内营养支持的患者，选择鼻胃管输注
B.对需短期肠内营养支持的患者，选择空肠造瘘输注
C.对导管尖端位于胃内或胃肠功能良好的患者选择按时分次喂养
D.对病情危重、胃肠道功能和耐受性较差的患者选择间隙重力灌注

63.患者胫骨骨折后，小腿持续剧烈疼痛、查体：小腿严重肿胀，颜色发白，明显压痛，足背动脉搏动微弱。最可能的诊断是（　）。
A.脂肪栓塞综合征　　B.胫神经损伤　　C.下肢深静脉血栓　　D.骨筋膜室综合征

64.下列选项中，不属于休克代偿期表现的是（　）。
A.神志清楚　　B.口渴　　C.脉压增大　　D.尿量正常或减少

65.下列贫血类型中，属于小细胞低色素性贫血的是（　）。
A.巨幼细胞贫血　　B.缺铁性贫血　　C.溶血性贫血　　D.急性失血性贫血

66.下列选项中，不属于肝硬化患者常见内分泌失调表现的是（　）。
A.雌激素增多　　B.雄激素增多　　C.胰岛素增多　　D.糖皮质激素减少

67.左心衰竭导致肾血流量减少，最可能出现的临床表现是（　）。
A.夜尿增多　　B.尿量减少　　C.尿频尿急　　D.尿色深黄

68.患者在青霉素皮试中出现过敏性休克，首选的抢救用药是（　）。
A.0.1%盐酸异丙嗪　　B.0.1%去甲肾上腺素　　C.0.1%盐酸肾上腺素　　D.0.1%异丙肾上腺素

69.慢性支气管炎患者的痰液常为（　）。
A.果酱黏痰　　B.白色黏痰　　C.灰白色痰　　D.铁锈色痰

70.法洛四联症患者最常见的体征是（　）。
A.生长发育迟缓　　B.二尖瓣面容　　C.心脏杂音　　D.杵状指（趾）

71.手术区皮肤准备范围一般为切口周围（　）的区域。
A.至少5cm　　B.至少10cm　　C.至少15cm　　D.至少25cm

72.细菌性痢疾患者解除隔离的时间是（　）。
A.体温正常，粪检阴性
B.所有临床症状消失，粪检阴性
C.急性期临床症状消失，粪检阴性，粪便培养1次阴性
D.急性期临床症状消失，粪检阴性，粪便培养连续2次阴性

73.患者持续高热1周，体温始终持续在39℃～40℃，此热型属于（　）。
A.稽留热　　B.弛张热　　C.间歇热　　D.波状热

74.急性心肌梗死最早、最突出的症状是（　）。
A.发热　　B.疼痛　　C.恶心、呕吐　　D.心律失常

患者，男性，28岁，食欲不振1周。实验室检查：丙氨酸氨基转移酶1400U/L，血清总胆红素32μmol/L，血清抗-HAV IgG阳性、HBsAg阳性、HBeAg阳性，抗-HBc IgM阳性。初步诊断为急性乙型病毒性肝炎。

75.材料中，提示患者过去感染过甲型肝炎病毒的检查结果是（　）。
A.抗-HAV IgG阳性　　B.HBsAg阳性
C.HBeAg阳性　　D.抗-HBc IgM阳性

76.急性乙型病毒性肝炎的主要传播途径是（　）。

A.空气传播　　B.粪－口途径传播　　C.日常生活接触传播　　D.血液－体液传播

77.当前对该患者拟采取的护理措施，正确的是（　）。

A.遵医嘱给予对症和恢复肝功能的药物　　B.早期给予患者高热量、高维生素、高纤维素食物

C.指导患者进行有氧运动，促进体力恢复　　D.嘱患者禁食纤维素含量丰富的食物、禁饮酒

患者，男性，68岁，限制卧床，消瘦，皮肤有潜在摩擦问题。

78.关于压力性损伤的表述，正确的有（　）。

A.压力性损伤是发生在皮肤和（或）潜在皮下软组织的侵入性损伤

B.造成压力性损伤的直接因素包括环境、灌注、营养和压力

C.局部压力超过终末毛细血管压得2倍，且持续时间在1～2小时之间，可阻断毛细血管对组织的灌流，导致压力性损伤的发生

D.坐位时，压力性损伤易发生于髋部、骶尾部

79.对该患者进行Braden评分，正确的是（　）。

A.活动度2分、营养2分、摩擦力和剪切力2分　　B.活动度1分、营养2分、摩擦力和剪切力2分

C.活动度1分、营养2分、摩擦力和剪切力3分　　D.活动度2分、营养2分、摩擦力和剪切力1分

80.针对该患者预防压疮的护理，正确的是（　）。

A.系统全面评估皮肤、保持皮肤清洁干燥　　B.控制饮食、降低体重、减轻骨隆突处的皮肤压力

C.为患者选取半坐卧位，减少摩擦力　　D.给予易消化流质饮食，增强机体抵抗力

患者，女，38岁，持续性右上腹疼痛3天，呈锐痛，向右肩胛部及腰背部放射，烦躁不安，寒战，高热，恶心呕吐，呕吐物为胃内容物。既往有肝外胆管结石病史。查体：体温39.1℃、血压90/60mmHg，脉搏130次/min，呼吸30次/min，神情淡漠。皮肤有出血点，巩膜黄染，右上腹有压痛，反跳痛。血常规：WBC 21×10^9/L，$N_{0.89}$。实验室检查：血清淀粉酶、脂肪酶正常。

81.该患者最可能的诊断是（　）。

A.急性胰腺炎　　B.急性胆囊炎

C.急性化脓性腹膜炎　　D.急性梗阻性化脓性胆管炎

82.下列解痉镇痛药物，不适用于该患者的是（　）。

A.阿托品　　B.吗啡　　C.山莨若碱　　D.哌替啶

83.后续住院治疗期间，患者出现神志淡漠、黄疸加深、少尿、肝功能异常、PaO_2降低、代谢性酸中毒及凝血酶原时间延长。最可能的诊断是（　）。

A.多脏器功能衰竭　　B.弥散性血管内凝血　　C.休克　　D.急性呼吸窘迫综合征

患者，男性，38岁。突发阵发性抽搐倒地、意识丧失、眼球凝视、牙关紧闭、口唇发绀、口吐白沫、尿失禁、前后持续约4分钟、发作后感觉头晕乏力、对抽搐过程无记忆、家属拨打120送往医院就诊，查体：体温36.2℃，脉搏90次/分，呼吸18次/分，血压100/70mmHg，神志清楚，回答问题基本切题，初步诊断为癫痫全面强直-阵挛发作。

84.癫痫全面强直-阵挛发作的分期及顺序是（　）。

A.阵挛期、强直期、发作后期　　B.强直期、阵挛期、发作后期
C.强直期、发作后期、阵挛期　　D.发作后期、强直期、阵挛期

85.若该患者在短期内癫痫连续发作多次且发作之间意识不清醒，则该发作类型属于（　）。
A.癫痫非典型失神发作　　B.癫痫肌阵挛性发作　　C.癫痫持续状态　　D.癫痫典型失神发作

86.该患者癫痫发作时，应首先给予的护理措施是（　）。
A.保持呼吸道通畅，防止外伤　　B.立即原地平躺，给予用药
C.采取保护措施，避免误吸　　D.用力按压肢体，制止发作

87.（多选题）“昏睡”状态的患者可表现为（　）。
A.处于熟睡状态，不易唤醒　　B.压迫眶上神经，可被唤醒
C.出现错觉、幻觉、谵语　　D.用力按压肢体，制止发作
E.停止刺激后随即进入熟睡状态

88.（多选题）对心脏骤停患儿实施急救，正确的操作有（　）。
A.使用单手或双手进行胸外按压，按压深度至少为5cm
B.进行人工呼吸时，使用较小的潮气量，确保胸部可见起伏
C.立即开始心肺复苏，同时指定人员呼叫急救电话并获取AED
D.在进行心肺复苏时，使按压与呼吸比例保持30:2
E.如使用AED除颤，应选择儿童专用电极贴片

89.（多选题）需要进行青霉素过敏实验的情形包括（　）。
A.近期曾使用青霉素，停药超过24小时　　B.近期曾使用青霉素，停药超过72小时
C.首次使用青霉素　　D.连续用药期间青霉素生产批号更换
E.有青霉素过敏史

90.（多选题）新生儿黄疸的分类包括（　）。
A.生理性黄疸　　B.病理性黄疸　　C.药物性黄疸　　D.感染性黄疸
E.感光性黄疸

患者，男性，63岁。2小时前与家人争吵后突发头痛、恶心，胃呕吐。既往有高血压病史20年，间断服用降压药物治疗，血压波动在140～150，90～100mmHg。查体：血压200/130mmHg，呼吸24次/分，心率90次/分，急性病容，视野模糊，诊断为高血压急症。

91.（多选题）长期血压增高主要损害的靶器官有（　）。
A.心　　B.脑　　C.脾　　D.肾
E.肝

92.（多选题）针对该患者应采取的护理措施包括（　）。
A.嘱患者绝对卧床休息　　B.安抚患者情绪
C.遵医嘱使用降压药物　　D.给予患者持续吸氧
E.加强患者与亲友的探视交流，解开心结

93.（多选题）针对该患者的出院健康宣教，正确的有（　）。
A.嘱患者限制钠盐摄入，应少于10g/天　　B.嘱患者多吃蔬菜水果，减少脂肪摄入
C.嘱患者戒烟限酒　　D.嘱患者减少咸菜、火腿、卤制品的摄入
E.嘱患者控制体重，合理运动

患者，男性，35岁，阵发性腹痛6小时，恶心，呕吐。腹痛进行性加重，由上腹部转移至右下腹。查体：体温38.6℃，脉搏108次/分，呼吸22次/分，血压130/82mmHg。全腹肌紧张，麦氏点压痛阳性，肠鸣音减弱，血常规：WBC $21.2\times10^{9}/L$，N $_{0.91}$，Hb $160g/L$。腹部X线影像示盲肠及回肠末端扩张和气液平面，诊断为急性阑尾炎。

94.（多选题）该患者当前可能存在的护理问题有（　）。

A.急性疼痛　　B.体温过高　　C.焦虑　　D.感染

E.腹泻

95.（多选题）针对该患者的疼痛护理措施，正确的有（　）。

A.评估患者疼痛持续的时间　　B.评估患者腹痛的部位、程度、性质等

C.嘱患者喝温牛奶缓解腹部疼痛　　D.协助患者取半卧位，减轻腹部张力

E.遵医嘱给予镇痛药

96.（多选题）该患者行腹腔镜下阑尾切除术，术后应进行的健康教育内容主要包括（　）。

A.介绍阑尾炎治疗、护理知识　　B.饮食指导，避免高脂、高糖、低膳食纤维饮食

C.指导术后每日饮水1500～2000ml　　D.指导出院后的复诊要求

E.指导术后多做有氧抗阻运动