2020年军队文职《临床学》真题精选

1、 单选题

最常见的输血不良反应是（ ）。

A： 溶血反应

B： 过敏反应

C： 非溶血性发热

D： 高血钾

2、 单选题

患者，男性，35岁。饮酒后突发左上腹疼痛，向腰背部放射，呈持续性。呕吐后疼痛不缓解。查体:体温38.6摄氏度，左上腹明显压痛。X线检查:膈下未见游离气体。该患者可能的诊断是（ ）。

A： 急性胆囊炎

B： 急性胰腺炎

C： 急性胃十二指肠溃疡穿孔

D： 急性阑尾炎

3、 单选题

过敏性紫癜的主要病因不包括（ ）。

A： 家族遗传

B： 细菌感染

C： 麻疹病毒

D： 花粉过敏

4、 单选题

高血压伴有低血钾时，最有效的降压药物为（ ）。

A： 硝苯地平

B： 氯噻嗪

C： 螺内酯

D： 卡托普利

5、 单选题

最适宜进行脾切除的溶血性贫血是（ ）。

A： 自身免疫性溶血性贫血

B： 阵发性睡眠性血红蛋白尿症

C： 海洋性贫血

D： 遗传性球形红细胞增多症

6、 单选题

一侧肢体瘫痪，精细触觉消失，对侧痛觉、温觉消失，常见于（ ）。

A： 脊髓横断

B： 脊髓半横断

C： 脊髓前角损伤

D： 脊髓中央部损伤

7、 单选题

患儿，女性，4个月。烦躁、多汗1个月，夜间哭闹不安，12月出生，单纯牛奶喂养，未添加辅食。查体:体重6.5kg,有颅骨软化。该患儿最可能的诊断是（ ）。

A： 蛋白质-能量营养不良

B： 维生素D缺乏性手足搐搦症

C： 维生素D缺乏性佝偻病

D： 缺铁性贫血

8、 单选题

患者，女性，50岁。2年前发现血压170/110mmHg，未规律治疗。1个月前诊断为糖尿病，口服降糖药治疗，目前血压、血糖均在正常范围。该患者高血压诊断正确的是（ ）。

A： 高血压2级，高危

B： 高血压3级，高危

C： 高血压2级，很高危

D： 高血压3级，很高危

9、 单选题

患者，女性，28岁。停经50天，要求终止妊娠，行人工流产术，术中突然出现面色苍白、恶心、呕吐、大汗淋漓。查体：心率45次/分，血压80/50mmHg。该患者最可能的诊断是（ ）。

A： 失血性休克

B： 人工流产综合征

C： 羊水栓塞

D： 子宫穿孔

---

10 、 单选题

下列哪项不属于周围型肺癌的典型X线影像表现？（ ）

A： 薄壁空洞，内见液平

B： 团块有毛刺、呈分叶状

C： 胸膜凹陷征

D： 孤立性团块影

---

11 、 单选题

先天性肥厚性幽门狭窄的特征性表现是（ ）。

A： 胃蠕动波

B： 右上腹肿块

C： 黄疸

D： 呕吐

---

12 、 单选题

患者，女性，22岁。近1年来常无诱因出现短暂意识不清，伴口角及右上肢抽搐，持续3分钟左右。该患者最可能的癫痫类型是（ ）。

A： 单纯部分性发作

B： 复杂部分性发作

C： 强直-阵挛发作

D： 失神发作

---

13 、 单选题

患者，男性，26岁。肉眼血尿、进行性少尿7天。查体:BP160/100mmHg，双下肢凹陷性水肿，尿蛋白（+++），尿RBC20?30个/HP,血Hb90g/L，SCr510jxmol/L。B超示双肾增大。

该患者初步诊断为（ ）。

A： 急性间质性肾炎

B： 急性肾小球肾炎

C： 急性肾盂肾炎

D： 急进性肾小球肾炎

---

14 、 单选题

患儿，男性，1个月。腹胀、便秘1个月。查体:腹部明显隆起，可见肠型和蠕动波。直肠指检时排出恶臭气体和大便腹部立位X线平片可见阶梯状液平面。该患儿最可能的诊断是（ ）。

A： 胎粪塞综合征

B： 坏死性小肠结肠炎

C： 先天性肠闭锁

D： 先天性巨结肠

---

15 、 单选题

患儿，男性，1个月。腹胀、便秘2个月。查体:腹部明显隆起，可见肠型和蠕动波。直肠指检时排出恶臭气体和大便腹部立位X线平片可见阶梯状液平面。为明确诊断，进一步的检查为（ ）。

A： 腹部B超检查

B： 钡剂灌肠检查

C： 直肠肌层活检

D： 直肠黏膜活检

---

16 、 单选题

患儿，男性，1个月。腹胀、便秘3个月。查体:腹部明显隆起，可见肠型和蠕动波。直肠指检时排出恶臭气体和大便腹部立位X线平片可见阶梯状液平面。该病最常见的并发症是（ ）。

A： 小肠结肠炎

B： 肠穿孔

C： 肠梗阻

D： 继发感染

---

17 、 单选题

患者，男性，65岁。左上腹无规律性疼痛5年。2年前诊断为慢性萎缩性胃炎。近1个月来逐渐出现腹痛加重、腹胀、受气，体重下降8kg。Hb90g/L。该患者首先考虑的疾病是（ ）。

A： 肠易激综合征

B： 胃癌

C： 十二指肠溃疡

D： 肝癌

---

18 、 单选题

患者，女性，56岁。糖尿病病史7年。查体：血压170/100mmHg,心率70次/分。实验室检查：血Cr85jxmoI/L，血K+4mmol/L，尿蛋白（+）。该患者血压应控制在（ ）。

A：

B：

C：

D：

---

19 、 单选题

患者，男性，65岁。左上腹无规律性疼痛5年。2年前诊断为慢性萎缩性胃炎。近1个月来逐渐出现腹痛加重、腹胀、受气，体重下降8kg。Hb9g/L。若检查发现胃壁僵硬，胃窦表面有4cm大小溃疡，触之出血，其最佳的治疗方法是（ ）。

A： 胃黏膜切除术

B： 胃空肠吻合术

C： 根治性胃大部切除术
D： 化学治疗

---

20 、 单选题

多发性骨髓瘤的特征是（ ）。
A： 贫血
B： 高钙血症
C： 骨髓中克隆性浆细胞异常增生
D： 肾功能损害

---

21 、 单选题

急进性肾小球肾炎n型最可能的检测异常是（ ）。
A： 血抗中性粒细胞胞质抗体阳性
B： 血抗肾小球基底膜抗体阳性
C： 循环免疫复合物阳性
D： 血单克隆免疫球蛋白升高

---

22 、 单选题

结核性腹膜炎最可能的表现为（ ）。
A： 乳糜性腹水
B： 腹水白细胞数>500x106/L，以多核细胞为主
C： 腹水比重>1.018,蛋白>30g/L，以单核细胞为主
D： 腹水比重

---

23 、 单选题

下列关于子宫腺肌病的表现的叙述，错误的是（ ）。
A： 子宫均匀性增大
B： 发病机制与子宫内膜异位症相同
C： 可有继发性进行性加重的痛经
D： CA125可轻度升高

---

24 、 单选题

患者，女性，45岁。皮肤出血点及牙龈出血1周。查体:肝脾未触及。血常规:Hb115g/L，WBC5.0x109/L，Plt10x109/L。骨髓细胞学检查：巨核细胞80个/2cmx2cm,产板型巨核细胞1个。该患者最可能的诊断是（
）。
A： 再生障碍性贫血
B： 急性白血病
C： 特发性血小板减少性紫癜
D： 骨髓增生异常综合征

---

25 、 单选题
患者，女性，40岁。不慎被重物砸伤，当时昏迷，醒后感四肢麻木无力。查体j申志清楚，四肢中枢性瘫痪，颈4以下的深、浅感觉障碍。损伤的部位可能是（ ）。
A： 颈膨大
B： 颈膨大以上颈髓
C： 胸髓
D： 腰膨大

---

26 、 单选题
滴虫阴道炎的典型白带性状是（ ）。
A： 稀薄脓性泡沫状白带
B： 白色稠厚凝乳状白带
C： 泔水状恶臭白带
D： 白色均质腥臭白带

---

27 、 单选题
心脏破裂多发生于急性心肌梗死起病（ ）。
A： 7天以内
B： 7~10天
C： 11?15天
D： 20天之后

---

28 、 单选题
患者，男性，26岁。肉眼血尿、进行性少尿7天。查体:BP160/100mmHg，双下肢凹陷性水肿，尿蛋白（+++），尿RBC20?30个/HP,血Hb90g/L，SCr511jxmol/L。B超示双肾增大。
该病常见于（ ）。
A： 系膜毛细血管性肾炎
B： 膜性肾病
C： 新月体性肾炎
D： 毛细血管内增生性肾炎

---

29 、 单选题
患者，男性，65岁。左上腹无规律性疼痛5年。2年前诊断为慢性萎缩性胃炎。近1个月来逐渐出现腹痛加重、腹胀、受气，体重下降8kg。Hb90g/L。最有诊断意义的辅助检查是（ ）。
A： 腹部B超检查
B： 消化道钡剂检查
C： 胃镜检查
D： 腹部立位平片

---

30 、 单选题

患者，女性，56岁。糖尿病病史7年。查体：血压170/100mmHg,心率70次/分。实验室检查：血Cr85jxmoI/L，血K+4mmol/L，尿蛋白（+）。最适宜的降压治疗药物为（ ）。

A： 依那普利
B： 硝苯地平
C： 美托洛尔
D： 氢氯噻嗪

---

31 、 多选题

动脉粥样硬化发病的主要危险因素包括（ ）。

A： 肥胖
B： 吸烟
C： 年龄
D： 性别
E： 血脂异常

---

32 、 多选题

患者，女性，29岁。妊娘40周，临产后宫缩强、规律，宫口开全后自然破膜，破膜后突然发生剧烈呛咳、烦躁不安、呼吸困难、发绀、血压骤降。需采取的处理措施包括（ ）。

A： 纠正呼吸衰竭
B： 纠正凝血功能障碍
C： 抗过敏
D： 大量补充液体
E： 终止妊娠

---

33 、 多选题

符合细菌性肝脓肿特点的有（ ）。

A： 多继发于胆道感染
B： 抗阿米巴治疗无效
C： 脓肿较大，多为单发
D： 脓肿较小，常为多发
E： 起病急骤，全身中毒症状不明显

---

34 、 多选题

下列关于子宫内膜癌的随访和预防的说法，正确的有（ ）。

A： 绝经后阴道流血应尽早治疗
B： 密切监测有肥胖、不孕、延迟绝经等高危因素的人群
C： 患者有林奇综合征，可每6个月进行1次妇科检查和内膜活检
D： 规范使用雌激素
E： 术后1年内每3个月随访1次，1?2年内每6个月随访1次

---

35 、 多选题

下列关于阻塞性肺气肿的叙述，正确的有（ ）。

A： 肺泡呼吸音降低

B： 肺下界上升

C： 叩诊呈过清音

D： 桶状胸

E： 触诊语音震颤增强

---

36 、 多选题

患者，女性，29岁。妊娘39周，临产后宫缩强、规律，宫口开全后自然破膜，破膜后突然发生剧烈呛咳、烦躁不安、呼吸困难、发绀、血压骤降。关于该病的描述，下列哪些是正确的？（ ）

A： 典型表现为突然发生的低氧血症、低血压及凝血功能障碍

B： 大多发生在分娩前1小时至分娩中

C： 可能是由于羊膜腔压力升高，羊水进入母体血液循环所致

D： 剖宫产时发生的概率比阴道分娩高

E： 可能损伤全身器官

---

37 、 多选题

小儿原发性肺结核的基本病变包括（ ）。

A： 渗出

B： 水肿

C： 机化

D： 坏死

E： 肥大

---

38 、 多选题

患者，女性,59岁。活动后心悸、气短1周，4小时前出现持续性胸痛、气促，休息后不缓解，伴恶心、呕吐。查体:端坐呼吸，血压100/70mmHg，心率110次/分，心尖部可闻及3/6级收缩期杂音，双肺散在哮鸣音及湿啰音。

该病的常见并发症包括（ ）。

A： 心律失常

B： 栓塞

C： 心室壁瘤

D： 主动脉破裂

E： 肺源性心脏病

---

39 、 多选题

患者，男性，25岁。2小时前车祸致左上臂受伤。查体:上臂肿胀、疼痛、畸形，伴活动受限，垂腕。该患者经治疗后，达到临床愈合标准的表现有（ ）。

A： 骨折处肿胀、畸形明显

B： 左上肢活动无异常
C： 骨折处无压痛及叩击痛
D： X线检查可见连续性骨痂
E： X线检查可见清晰的骨折线

---

40 、 多选题

患者，男性，17岁。咳嗽、咳痰1个月余，多于午后发热，伴乏力、盗汗。查体:体温38.22，双肺无啰音。胸部X线片示肺门处可见高密度团块影。如该病处于活动期，下列治疗中，叙述错误的有（ ）。
A： 原则是早期、规律、全程、适量、联合
B： 强化期使用异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
C： 巩固期使用异烟肼、利福平
D： 强化期疗程为4个月
E： 巩固期疗程为2个月

---

41 、 多选题

下列哪些属于法洛四联症的畸形组成？（ ）
A： 主动脉骑跨
B： 左心室肥厚
C： 室间隔缺损
D： 右心室流出道梗阻
E： 主动脉狭窄

---

42 、 多选题

下列符合缺铁性贫血检查的结果有（ ）。
A： 血清铁降低
B： 转铁蛋白饱和度降低
C： 总铁结合力降低
D： 红细胞内游离原卟啉增多
E： 网织红细胞降低

---

43 、 多选题

下列是由红细胞膜异常导致的溶血性疾病有（ ）。
A： 遗传性球形红细胞增多症
B： 地中海贫血
C： 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
D： 异常血红蛋白病
E： 镰状细胞贫血

---

44 、 多选题

高血压主要损害的靶器官包括（ ）。
A： 心
B： 脑
C： 肾
D： 胃
E： 肝

---

45 、 多选题

处理医师与医师之间关系的道德要求有（ ）。
A： 团结友爱
B： 互相尊重
C： 公平竞争
D： 互相学习
E： 彼此信任

---

46 、 多选题

患者，男性，25岁。1小时前车祸致左上臂受伤。查体:上臂肿胀、疼痛、畸形，伴活动受限，垂腕。该患者最可能的诊断有（ ）。
A： 肱骨外科颈骨折
B： 肱骨干骨折
C： 肱骨髁上骨折
D： 尺神经损伤
E： 桡神经损伤

---

47 、 多选题

患者，女性,59岁。活动后心悸、气短1周，4小时前出现持续性胸痛、气促，休息后不缓解，伴恶心、呕吐。查体:端坐呼吸，血压100/70mmHg，心率110次/分，心尖部可闻及3/6级收缩期杂音，双肺散在哮鸣音及湿啰音。
该患者应考虑的诊断有（ ）。
A： 心绞痛
B： 急性左心衰竭
C： 二尖瓣狭窄
D： 主动脉夹层
E： 急性心肌梗死

---

48 、 多选题

患者，女性,59岁。活动后心悸、气短1周，4小时前出现持续性胸痛、气促，休息后不缓解，伴恶心、呕吐。查体:端坐呼吸，血压100/70mmHg，心率110次/分，心尖部可闻及3/6级收缩期杂音，双肺散在哮鸣音及湿啰音。
下列关于该病的治疗措施的叙述，正确的有（ ）。
A： 心电监护
B： 呋塞米静脉注射

C： 大剂量口服美托洛尔
D： 尿激酶静脉滴注
E： 吗啡静脉注射

---

49 、 多选题

患者，男性，17岁。咳嗽、咳痰1个月余，多于午后发热，伴乏力、盗汗。查体:体温38.21，双肺无啰音。胸部X线片示肺门处可见高密度团块影。该病的基本病理变化有（ ）。
A： 淀粉样变
B： 化生
C： 炎性渗出
D： 增生
E： 干酪样坏死

---

50 、 多选题

患者，男性，17岁。咳嗽、咳痰1个月余，多于午后发热，伴乏力、盗汗。查体:体温38.23，双肺无啰音。胸部X线片示肺门处可见高密度团块影。该患者进行抗结核药物治疗后，出现面色黄染，四肢末端麻木。应采取的措施有（ ）。
A： 加用维生素A
B： 加用维生素B6
C： 加用维生素B12
D： 停用利福平
E： 停用乙胺丁醇
