2020年军队文职人员招聘《中药学》真题

1、 单选题

九仙散的功用是（ ）

A： 温肺化痰，疏风止咳

B： 润肺清热，理气化痰

C： 清热化痰，宣肺止咳

D： 敛肺止咳，益气养阴

E： 燥湿化痰，理气止咳

2、 单选题

善"治无汗之骨蒸"的药物是（ ）

A： 生地黄

B： 紫草

C： 玄参

D： 牡丹皮

E： 地骨皮

3、 单选题

功能疏肝破气、散结消滞的药物是（ ）

A： 青皮

B： 香附

C： 枳实

D： 木香

E： 沉香

4、 单选题

茵陈保肝作用的机制是

A： 有效成分水解生成葡萄糖醛酸

B： 保护生物膜

C： 兴奋垂体-肾上腺皮质系统

D： 降血脂

E： 抑制葡萄糖醛酸酶活性

5、 单选题

药品的安全性、有效性、稳定性、均一性、经济性是药品的

A： 质量特征

B： 临床应用基本要求

C： 特殊性

D： 质量管理内容

E： 新的发展趋势

6、 单选题

小柴胡汤的组成药物中含有（ ）

A： 黄芩

B： 干姜

C： 白术

D： 芍药

E： 当归

7、 单选题

实脾散的功用是（ ）

A： 利水渗湿，温阳化气

B： 温阳健脾，行气利水

C： 解表化湿，理气和中

D： 温阳利水

E： 温中散寒，行气散满

8、 单选题

主治阴虚血少、神志不安证之心悸失眠可选用（ ）

A： 朱砂安神丸

B： 天王补心丹

C： 归脾汤

D： 补中益气汤

E： 甘麦大枣汤

9、 单选题

峻下逐水药的服法是（ ）

A： 空腹时服

B： 睡前服

C： 饭后服

D： 小量频服

E： 不拘时服

---

10 、 单选题

具有清泻三焦结热的功用的方剂为（ ）

A： 小承气汤

B： 防风通圣散

C： 石膏汤

D： 葛根芩连汤

E： 普济消毒饮

---

11 、 单选题

中药厚朴中含有的厚朴酚是（ ）

A： 双环氧木脂素类

B： 联苯环辛烯型木脂素类

C： 环木脂内酯木脂素类

D： 新木脂素类

E： 简单木脂素类

---

12 、 单选题

当归、黄芩一般宜（ ）

A： 醋制

B： 蜜制

C： 盐制

D： 酒制

E： 土炒

---

13 、 单选题

功效不同，不可同放于一个斗中的是（ ）

A： 板蓝根和大青叶

B： 当归和川芎

C： 篇蓄和瞿麦

D： 当归和独活

E： 牡丹皮和赤芍

---

14 、 单选题

下列除哪项外，均为五味子的功效（ ）

A： 敛肺滋肾

B： 生津敛汗

C： 安蛔止痛

D： 涩精止遗

E： 宁心安神

15、 单选题

表里双解剂适用于（ ）

A： 表寒里热证

B： 表证已解，里未结实之证

C： 表里俱热证

D： 表里俱寒证

E： 表里同病之证

16、 单选题

最易变色的中药饮片是（ ）

A： 根类饮片

B： 皮类饮片

C： 种子类饮片

D： 叶类饮片

E： 花类饮片

17、 单选题

若羟基蒽醌对醋酸镁试剂呈蓝紫色，则其羟基位置可能是（ ）

A： 1，8-二羟基

B： 1，5-二羟基

C： 1，2，3-三羟基

D： 1，4，8-三羟基

E： 1，3-二羟基

18、 单选题

粉防己碱抗炎作用机制是（ ）

A： 兴奋垂体-肾上腺皮质功能

B： 促进中性白细胞游走

C： 抑制前列腺素合成

D： 抑制中枢神经系统

E： 以上均非

19、 单选题

凭《麻醉药品专用卡》每次取药量不得超过（ ）

A： 7日常用量

B： 5日常用量

C： 3日常用量

D： 2日常用量

E： 4日常用量

---

20 、 单选题

对环磷酰胺引起的白细胞减少具有促进恢复作用的药物是

A： 艾叶

B： 三七

C： 紫珠

D： 槐花

E： 白茅根

---

21 、 单选题

药品的有（ ）效期，是指

A： 药品在规定的储存条件下保证有效的期限

B： 药品在规定的储存条件下保持稳定的期限

C： 药品在一定的储存条件下能够保持质量的期限

D： 药品在规定的储存条件下使用安全的期限

E： 药品在规定的储存条件下对质量负责的期限

---

22 、 单选题

青皮对心血管系统的作用是

A： 升压

B： 降压

C： 改善微循环

D： 降低心率

E： 先降压后升压

---

23 、 单选题

同时具有抗心肌缺血、抗心律失常、降血压作用的药物是

A： 苦参

B： 钩藤

C： 三七

D： 地龙

E： 天麻

---

24 、 单选题

在质量控制中，需要进行乙醇量测定的剂型是

A： 糖浆剂

B： 合剂

C： 浸膏剂

D： 酊剂

E： 煎膏剂

---

25 、 单选题

特殊管理的药品是指

A： 麻醉药品、放射性药品、毒性药品、抗肿瘤药品

B： 麻醉药品、放射性药品、毒性药品、生物制品

C： 生物制品、放射性药品、毒性药品、精神药品

D： 麻醉药品、放射性药品、毒性药品、精神药品

E： 放射性药品、毒性药品、精神药品、抗肿瘤药品

---

26 、 单选题

在水包油型软膏剂中，作油相的辅料是

A： 吐温-80

B： 甘油

C： 硬脂酸

D： 二甲基亚砜

E： 单硬脂酸甘油脂

---

27 、 单选题

药品监督管理的原则之一是

A： 质量与数量第一

B： 法制化与科学化的高度统一

C： 经济效益优先

D： 专业监督管理为主

E： 群众性监督管理为主

---

28 、 单选题

从影响中药药理作用的观点来看，以下论述错误的是（ ）

A： 中药应采收有时

B： 中药煎煮时间愈长，则煎出的成分愈多，作用愈强

C： 中药经过炮制可增效或减毒

D： 道地药材的药理作用一般优于非正品药材

E： 同样的药物和剂量，如果剂型不同其药理作用强度也可不同

---

29 、 单选题

醋制芫花的目的是（ ）

A： 引药入肝，增强疏肝理气作用

B： 降低毒性，缓和泻下作用

C： 增强活血止痛作用

D： 增强疏肝止痛作用

E： 增强理气解痉作用

---

30 、 单选题

为了分离药用部位而去心的药物是

A： 牡丹皮

B： 地骨皮

C： 五加皮

D： 巴戟天

E： 莲子

---

31 、 单选题

附子中毒的主要症状是

A： 溶血

B： 高热

C： 口舌发麻

D： 血尿

E： 便血

---

32 、 单选题

处方用药剂量超过常用量，必须重新签字后方可计价、调配，签字人是

A： 业务院长

B： 药房负责人

C： 处方医师

D： 审方人

E： 患者

---

33 、 单选题

药用部位为动物的输卵管的药材是

A： 鹿茸

B： 牛黄

C： 蛤蟆油

D： 蟾酥

E： 五灵脂

---

34 、 单选题

可用于晕车晕船，具有解表祛湿和中功能的药是

A： 参苏丸

B： 九味羌活丸

C： 午时茶颗粒

D： 藿香正气水

E： 保济丸

---

35 、 单选题

加辅料炒不包括

A： 土炒

B： 米炒

C： 酒炒

D： 蛤粉炒

E： 滑石粉炒

---

36 、 单选题

中药饮片内包装材料，可选用的是（ ）

A： 麻袋

B： 竹筐

C： 塑料编织袋

D： 牛皮纸

E： 布袋

---

37 、 单选题

小叶海藻的特征是

A： 叶条形或细匙形、气囊纺锤形或球形，无刺状突起

B： 叶圆形，全缘，气囊椭圆形

C： 叶披针形、狭披针形或丝状，全缘或有锯齿，革质，有片状突起

D： 叶丝状，丛生，革质

E： 叶倒卵形或卵状披针形，气囊球形或卵球形，侧枝上有细小刺状突起

---

38 、 单选题

药材略呈扁斜方形，外皮黄棕色或黄绿色，两侧各具一条色较浅的斜形凹纹。此药材是

A： 菟丝子

B： 决明子

C： 白芥子

D： 牵牛子

E： 沙苑子

---

39 、 单选题

下列药物不宜以细粉直接加入压片的是（ ）

A： 麝香

B： 夏枯草

C： 牛黄

D： 天花粉

E： 冰片

---

40 、 单选题

痰迷心窍所致的痰厥昏迷、中风偏瘫及中暑、心胃气痛应该选用的常用中成药是

A： 万氏牛黄清心丸

B： 苏合香丸

C： 安宫牛黄丸（胶囊、散）

D： 紫雪膏（紫雪）

E： 橘贝半夏颗粒颗粒

---

41 、 单选题

荷叶、厚朴等药材，经处理后宜切制

A： 薄片

B： 丝

C： 斜片

D： 厚片

E： 段

---

42 、 单选题

下列关于表面活性剂性质的叙述，正确的是（ ）

A： 表面活性剂分子结构中含有亲水基团和亲油基团

B： 不同结构的表面活性剂都有各自的特点

C： 表面活性剂不可用于注射液中

D： 非离子型表面活性剂的毒性较大，很少用于内服制剂中

E： 表面活性剂的HLB值越高，亲油性越强

---

43 、 单选题

地榆炒炭的主要作用是

A： 泻下通便

B： 消积化瘀

C： 润肺止咳

D： 凉血解毒

E： 收敛止血

---

44 、 单选题

用于制备西瓜霜的药物除成熟的西瓜外还有

A： 石膏

B： 滑石

C： 白矾

D： 芒硝

E： 硼砂

45、 单选题

下列关于热原性质的叙述，不正确的是（ ）

A： 水溶性

B： 挥发性

C： 耐热性

D： 滤过性

E： 被吸附性

46、 单选题

血竭的原植物科名和树脂类型是

A： 松科，单树脂

B： 金缕梅科，香树脂

C： 橄榄科，油胶树脂

D： 棕榈科，单树脂

E： 伞形科，油胶树脂

47、 单选题

下列药物在制备水丸时，应制成药汁的是（ ）

A： 大腹皮

B： 牛黄

C： 人参

D： 黄芪

E： 甘草

48、 单选题

下列药材中，原植物属于小檗科的是（ ）

A： 茵陈蒿

B： 淫羊藿

C： 细辛

D： 麻黄

E： 紫花地丁

49、 单选题

制备水丸的药粉要求通过多少目筛（ ）

A： 80

B： 90

C： 100

D： 110

E： 140

---

50 、 单选题

空气相对湿度较大，则中药材不易发生（ ）

A： 生虫

B： 霉变

C： 潮解

D： 风化

E： 走味

---

51 、 单选题

能杀死全部细菌和芽胞的方法是（ ）

A： 热压灭菌

B： 流通蒸汽灭菌法

C： 煮沸灭菌法

D： 过滤除菌法

E： 低温间歇灭菌法

---

52 、 单选题

健胃药和刺激性药宜（ ）

A： 饭前服

B： 饭后服

C： 睡觉前服

D： 发作前1～2小时服

E： 空腹服

---

53 、 单选题

大黄微量升华物加碱显（ ）

A： 黄色

B： 橙色

C： 红色

D： 碧蓝色

E： 暗紫色

---

54 、 单选题

不能装于同一药斗或上、下药斗的药组是（ ）

A： 附子与天花粉

B： 升麻与葛根

C： 射干与北豆根

D： 橘核与小茴香

E： 川乌与草乌

---

55 、 单选题

呈圆柱形。根头略膨大，可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄残基和密集的疣状突起的药材是（ ）

A： 延胡索
B： 山豆根
C： 板蓝根
D： 地榆
E： 乌头

---

56 、 单选题

以下不是《中国药典》收录的知母药材及其饮片的是（ ）

A： 盐知母
B： 毛知母
C： 酒知母
D： 知母肉
E： 知母

---

57 、 单选题

煎后药渣挤出的残液应不超出药渣总量的（ ）

A： 15%
B： 10%
C： 25%
D： 20%
E： 5%

---

58 、 单选题

呈纺锤形，两端略尖。表面黄白色或淡黄色，有细纵皱纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小的药材是（ ）

A： 射干
B： 麦冬
C： 百部
D： 山麦冬
E： 天冬

---

59 、 单选题

白芍的主产地是（ ）

A： 湖南、湖北、河南
B： 河北、山西、陕西
C： 浙江、安徽、四川
D： 山东、江苏、福建
E： 贵州、云南、广西

60 、 单选题

引起花类药材变色的主要因素是（ ）

A： 温度

B： 霉菌

C： 空气

D： 湿度

E： 日光

61 、 单选题

淡附片的炮制需用（ ）

A： 胆汁、甘草和水共煮

B： 黑豆、甘草和水共煮

C： 米泔水、甘草和水共煮

D： 姜汁、甘草和水共煮

E： 酒、甘草和水共煮

62 、 单选题

下列化合物属于黄酮醇的是（ ）

A： 葛根素

B： 橙皮苷

C： 大豆素

D： 山柰酚

E： 黄芩苷

63 、 单选题

辛味药所含的主要成分是（ ）

A： 有机酸

B： 氨基酸

C： 挥发油

D： 皂苷

E： 生物碱

64 、 单选题

鉴别黄酮类化合物分子中是否存在3-或5-羟基的试剂是（ ）

A： 四氢硼钠

B： 二氯氧锆-枸橼酸

C： 醋酸铅溶液

D： 三氯化铁

E： 醋酸镁

65、 单选题

焦四仙是焦三仙加上（ ）

A： 焦谷芽

B： 焦槟榔

C： 焦山楂

D： 焦神曲

E： 焦麦芽

66、 单选题

浸泡中药饮片的水温不宜超过（ ）

A： 40

B： 20

C： 50

D： 60

E： 30

67、 单选题

下列成分的水溶液，经振摇能产生肥皂样泡沫的是（ ）

A： 皂苷

B： 蒽醌

C： 生物碱

D： 强心苷

E： 黄酮

68、 单选题

沸后用武火煎10～15分钟为宜的中药是（ ）

A： 清热药

B： 温里药

C： 止血药

D： 滋补药

E： 解表药

69、 单选题

具抗炎作用，用于治疗胃溃疡的活性成分为

A： 羽扇豆烷醇

B： 甘草皂苷和甘草次酸

C： 齐墩果酸

D： 人参皂苷

E： 薯蓣皂苷元

70 、 单选题

药品不良反应的英文简称是（ ）

A： OTC

B： ADR

C： PD

D： GAP

E： ISO

71 、 单选题

有溶解胆结石作用的成分是（ ）

A： α-猪去氧胆酸

B： 牛磺酸

C： 鹅去氧胆酸

D： 胆酸

E： 去氧胆酸

72 、 单选题

动物类药物如蛇类、虫类等宜与共贮的有（ ）

A： 大枣

B： 五味子

C： 山茱萸

D： 花椒

E： 决明子

73 、 单选题

一蓝色中性油状物，易溶于低极性溶剂，与苦味酸可生成结晶性衍生物，此油状物可能是（ ）

A： 二萜类

B： 环烯醚萜

C： 蒽类

D： 萜类

E： 黄酮类

74 、 单选题

用右旋糖酐、能量合剂抢救心肌梗死病人宜联用的中药是（ ）

A： 冠心苏合丸与速效救心丸

B： 丹参注射液与黄芪注射液

C： 心通络胶囊与复方丹参片

D： 木香顺气丸与麝香保心丸

E： 复方丹参片与血府逐瘀丸

75、 单选题

伤科七味片服用过量，其主要中毒表现为（ ）

A： 千金子中毒特征
B： 朱砂中毒特征
C： 蟾酥中毒特征
D： 马钱子中毒特征
E： 雄黄中毒特征

76、 单选题

由于水停气滞所致水肿，症见蓄水腹胀，四肢浮肿，胸腹胀满，停饮喘急，大便秘结，小便短少时应选用（ ）

A： 清宁丸
B： 新清宁片
C： 清火片
D： 黄连上清丸
E： 舟车丸

77、 单选题

服用时应该摇匀的常用中成药是（ ）

A： 人参保肺丸
B： 党参理中丸
C： 香砂养胃颗粒（丸）
D： 良附丸
E： 小建中合剂

78、 单选题

石决明煅后增强（ ）

A： 固涩收敛、明目作用
B： 散瘀止痛作用
C： 收湿止痒作用
D： 收敛止血作用
E： 收湿敛疮作用

79、 单选题

下列选项中是济生肾气丸的功能的是（ ）

A： 温肾化气
B： 养阴生津
C： 滋阴补肾

D： 温补气血
E： 健脾益气

---

80 、 单选题

代赭石煅淬所用的辅料是（ ）
A： 醋
B： 盐水
C： 米泔水
D： 酒
E： 黄连水

---

81 、 单选题

朱砂安神丸适应于心火亢盛证和（ ）
A： 肝气郁滞
B： 失眠多梦，大便干燥
C： 阴虚火旺
D： 心气虚寒
E： 阴血不足证

---

82 、 单选题

鉴别木质化细胞壁的试液是（ ）
A： 氯化锌碘试液
B： 三氯化铁试液
C： α-萘酚试液
D： 钌红试液
E： 间苯三酚试液和盐酸

---

83 、 单选题

四逆散的功能是透解郁热和（ ）
A： 消胀止痛
B： 疏肝理脾
C： 宽中除满
D： 疏肝理气
E： 和胃止痛

---

84 、 单选题

在显微镜下测量细胞及细胞内含物等的大小时使用的长度单位是（ ）
μm
A： nm
B： cm

C： mm
D： E

---

85 、 单选题

性状上具有"白颈"特征的中药材是（ ）
A： 僵蚕
B： 水蛭
C： 地龙
D： 蜈蚣
E： 全蝎

---

86 、 单选题

天麻钩藤颗粒的功能是（ ）
A： 平肝息风、清热安神
B： 疏风活血、通络止痛
C： 平肝潜阳、醒脑安神
D： 理气解郁、宽中除满
E： 平肝息风、镇心安神

---

87 、 单选题

最适于分析含挥发油及其他挥发性组分的中药和中成药的方法是（ ）
A： 高效毛细管电泳法
B： 薄层色谱法
C： 高效液相色谱法
D： 气相色谱法
E： 蛋白质电泳法

---

88 、 单选题

湿热下注所致的淋证宜用（ ）
A： 九气拈痛丸
B： 八正合剂
C： 癃闭舒胶囊
D： 三金片
E： 肾炎四味片

---

89 、 单选题

多数为粉末（ ）
A： 皂苷
B： 皂苷元
C： A及B两者均有

D： A及B两者均无

90、 单选题

没有发泡性（ ）

A： 皂苷

B： 皂苷元

C： A及B两者均有

D： A及B两者均无

91、 单选题

无明显熔点（ ）

A： 皂苷

B： 皂苷元

C： A及B两者均有

D： A及B两者均无

92、 单选题

性温，能泻水逐饮，杀虫疗疮的药物是（ ）

A： 牵牛子

B： 大黄

C： 芫花

D： 甘遂

E： 千金子

93、 单选题

性寒，能泻下逐水，去积杀虫的药物是（ ）

A： 牵牛子

B： 大黄

C： 芫花

D： 甘遂

E： 千金子

94、 单选题

性温，泻下逐水，破血消癥的药物是（ ）

A： 牵牛子

B： 大黄

C： 芫花

D： 甘遂

E： 千金子

95 、 单选题

易燃的中药品种是（ ）

A： 火硝、硫黄

B： 蜜炙款冬花、蜜炙枇杷叶

C： 独活、火麻仁

D： 芒硝、硼砂

E： 樟脑、冰片

---

96 、 单选题

易泛油的中药品种是（ ）

A： 火硝、硫黄

B： 蜜炙款冬花、蜜炙枇杷叶

C： 独活、火麻仁

D： 芒硝、硼砂

E： 樟脑、冰片

---

97 、 单选题

易风化的中药品种是（ ）

A： 火硝、硫黄

B： 蜜炙款冬花、蜜炙枇杷叶

C： 独活、火麻仁

D： 芒硝、硼砂

E： 樟脑、冰片

---

98 、 单选题

易污染的中药品种是（ ）

A： 火硝、硫黄

B： 蜜炙款冬花、蜜炙枇杷叶

C： 独活、火麻仁

D： 芒硝、硼砂

E： 樟脑、冰片

---

99 、 单选题

区别甲型和乙型强心苷可用以下哪种反应

A： 乙酐-浓硫酸反应

B： 三氯乙酸-氯胺T反应

C： 亚硝酰铁氰化钠反应

D： Keller-Kiliani反应

E： 三氯化锑反应

---

100 、 单选题

区别甲型和乙型强心苷可用以下哪种反应

A： 乙酐-浓硫酸反应

B： 三氯乙酸-氯胺T反应

C： 亚硝酰铁氰化钠反应

D： Keller-Kiliani反应

E： 三氯化锑反应