2021年军队文职人员招聘《中药学》真题

1、 单选题

流浸膏剂中乙醇的含量不得少于（ ）

A： 10%

B： 15%

C： 20%～50%

D： 55%～60%

E： 65%～70%

2、 单选题

净选时巴豆应（ ）

A： 去皮壳

B： 去芦

C： 去毛

D： 去核

E： 去心

3、 单选题

主治血热风燥型白疕的是（ ）

A： 京万红

B： 消风止痒颗粒

C： 消银颗粒

D： 地榆槐角丸

E： 紫草膏

4、 单选题

处方书写大麻仁，应付（ ）

A： 大麻子

B： 胡麻子

C： 火麻仁

D： 蓖麻子

E： 亚麻子

5、 单选题

属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中的是（ ）

A： 当归与独活

B： 甘草与京大戟

C： 龙眼肉、青黛

D： 珍珠、冬虫夏草

E： 牛黄、麝香

6、 单选题

甘油在软胶囊剂囊材中的作用是（ ）

A： 黏合剂

B： 增稠剂

C： 防腐剂

D： 增塑剂

E： 乳化剂

7、 单选题

调剂时应付盐炙品的是（ ）

A： 肉桂

B： 赤石脂

C： 肉豆蔻

D： 肉苁蓉

E： 车前子

8、 单选题

用半夏的止呕功效，应首选（ ）

A： 清半夏

B： 姜半夏

C： 法半夏

D： 生半夏

E： 半夏曲

9、 单选题

下列哪种药材的叶对生，但茎不是方形（ ）

A： 广藿香

B： 金钱草

C： 穿心莲

D： 益母草

E： 薄荷

10、 单选题

关于炮制品的质量要求叙述不正确的是（ ）

A： 炮制品应具原有气味

B： 炮制品的含水量宜控制在3%～5%

C： 炮制品的色泽常作为炮制程度及内在质量变异的标志之一

D： 有毒成分要规定限量指标

E： 动物类、矿物类含杂质不得超过2%

11、 单选题

下列关于龙牡壮骨颗粒说法错误的是（ ）

A： 滋补肝肾，明目

B： 实热证者慎用

C： 益气养阴剂

D： 适用于脾胃气虚所致的小儿发育迟缓证

E： 为中西药制剂

12、 单选题

马钱子中的生物碱主要是（ ）

A： 吲哚类

B： 异喹啉类

C： 莨菪烷类

D： 喹喏里西啶类

E： 有机胺类

13、 单选题

入水柱头膨胀呈喇叭状，染水呈黄色，香气特异的药材是（ ）

A： 洋金花

B： 金银花

C： 西红花

D： 丁香

E： 辛夷

14、 单选题

易升华的药材为（ ）

A： 黄芪

B： 薄荷油

C： 肉桂

D： 乳香

E： 冰片

15、 单选题

在外用膏中，促进药物渗透的附加剂是（ ）

A： 吐温-80

B： 甘油

C： 硬脂酸

D： 二甲基亚砜

E： 单硬脂酸甘油脂

16、 单选题

根据归经学说，用辅料炮制药物，盐制入（ ）

A： 心

B： 肝

C： 脾

D： 肺

E： 肾

17、 单选题

将处方中全部饮片粉碎成细粉，加适宜辅料制成的中药片剂称为（ ）

A： 分散片

B： 全浸膏片

C： 全粉末片

D： 半浸膏片

E： 提纯片

18、 单选题

下列对雄黄性状的描述不正确的是（ ）

A： 块状或粒状集合体

B： 呈深红色或橙红色

C： 断口贝壳状，暗红色

D： 燃烧时有强烈蒜臭气

E： 气清香，味清凉

19、 单选题

儿茶不含的成分是（ ）

A： 生物碱

B： 鞣质

C： 黄酮类

D： 树胶

E： 低聚糖

---

20 、 单选题

为治虚寒性出血之要药，尤宜于崩漏与胎漏的药物是（ ）

A： 小蓟

B： 高良姜

C： 炮姜

D： 槐花

E： 艾叶

---

21 、 单选题

不合理用药的后果之一是（ ）

A： 安全、有效、简便、经济

B： 浪费医药资源

C： 准确辨析患者病证

D： 合理配伍用药

E： 认真审方堵漏

---

22 、 单选题

下列药材中，硬度最小的是（ ）

A： 朱砂

B： 赭石

C： 石膏

D： 滑石

E： 自然铜

---

23 、 单选题

不作内服的药物是（ ）

A： 升药

B： 砒石

C： 斑蝥

D： 大蒜

E： 马钱子

---

24 、 单选题

下列除哪项外，均可疏肝理气（ ）

A： 陈皮

B： 川楝子

C： 香附

D： 佛手

E： 青皮

25、 单选题

下列各项中哪项不是散剂的特点（ ）

A： 不易变质

B： 服用方便

C： 吸收缓慢

D： 节省药材

E： 制备简便

26、 单选题

镇肝熄风汤的功用包括（ ）

A： 滋阴潜阳

B： 活血通络

C： 疏肝理脾

D： 凉血止血

E： 理气宽胸

27、 单选题

甲型和乙型强心苷结构主要区别点是（ ）

A： 不饱和内酯环不同

B： 糖链连接位置不同

C： A/B环稠合方式不同

D： 内酯环的构型不同

E： 内酯环的位置不同

28、 单选题

能减轻或消除毒副作用的配伍是（ ）

A： 相恶

B： 相杀

C： 相须

D： 相反

E： 相使

29、 单选题

发散及气味芳香的药物入煎剂宜（ ）

A： 先煎

B： 后下

C： 包煎

D： 另煎

E： 烊化

---

30 、 单选题

小青龙汤中配伍酸敛的芍药和五味子的主要意义是（ ）

A： 佐助

B： 佐制

C： 引经

D： 调和

E： 反佐

---

31 、 单选题

车前子具有的功效是（ ）

A： 清心除烦

B： 清胃止呕

C： 清肺化痰

D： 清热解毒

E： 清热凉血

---

32 、 单选题

入汤剂宜后下的药物是（ ）

A： 香附

B： 厚朴

C： 苍术

D： 香薷

E： 白豆蔻

---

33 、 单选题

镇肝熄风汤中配伍生麦芽的意义在于（ ）

A： 消积退乳

B： 舒肝和胃

C： 益阴敛汗

D： 健脾养胃

E： 消食化滞

---

34 、 单选题

医疗用毒性药品是指毒性剧烈的药品，并且（ ）

A： 治疗剂量与中毒剂量无关

B： 治疗剂量与中毒剂量相近

C： 治疗剂量远大于中毒剂量

D： 治疗剂量远小于中毒剂量

E： 治疗剂量较大中毒剂量较小

35、 单选题

下列生物碱中，碱性最强的化合物是（ ）

A： 小檗碱

B： 苦参碱

C： 麻黄碱

D： 新番木鳖碱

E： 秋水仙碱

36、 单选题

磺酸型阳离子交换树脂可用于分离（ ）

A： 强心苷

B： 有机酸

C： 醌类

D： 苯丙素

E： 生物碱

37、 单选题

具有强心作用的温里药是（ ）

A： 附子

B： 肉桂

C： 吴茱萸

D： 丁香

E： 小茴香

38、 单选题

水蒸气蒸馏法适宜于提取的成分是（ ）

A： 生物碱盐

B： 挥发油

C： 强心苷

D： 皂苷

E： 蒽醌

39、 单选题

我国主管全国药品监督管理工作的部门是（ ）

A： 国务院药品监督管理部门

B： 国务院宏观经济综合主管部门

C： 技术监督部门

D： 药品检验部门

E： 工商管理部门

---

40 、 单选题

具有降血脂作用的药物是（ ）

A： 麦芽

B： 神曲

C： 莱菔子

D： 鸡内金

E： 山楂

---

41 、 单选题

蒲黄的常用炮制方法是（ ）

A： 炒黄法

B： 炒焦法

C： 麸炒法

D： 炒炭法

E： 砂炒法

---

42 、 单选题

具有明显镇痛作用的药物是（ ）

A： 延胡索

B： 川芎

C： 红花

D： 益母草

E： 丹参

---

43 、 单选题

大黄泻下作用的部位主要在（ ）

A： 小肠

B： 大肠

C： 十二指肠

D： 直肠

E： 胃

---

44 、 单选题

下列哪项不是开窍药的主要药理作用（ ）

A： 调节中枢神经功能

B： 抗心肌缺血

C： 抗炎

D： 调节机体免疫功能

E： 以上均非

45、 单选题

既可补气健脾，又可燥湿利水的药物（ ）

A： 黄芪

B： 茯苓

C： 白术

D： 苍术

E： 党参

46、 单选题

处方写番木鳖，应付（ ）

A： 马钱子

B： 山栀子

C： 番泻叶

D： 海南子

E： 木鳖子

47、 单选题

有"疮家圣药"之称的药物是（ ）

A： 黄连

B： 黄芩

C： 蒲公英

D： 板蓝根

E： 连翘

48、 单选题

药用部位为根及根茎的药材是（ ）

A： 黄芪

B： 虎杖

C： 板蓝根

D： 牛膝

E： 党参

49、 单选题

能引火下行，治肾阳不足，虚火上浮之面红足冷等证的药物是（ ）

A： 肉桂

B： 附子

C： 吴茱萸

D： 干姜

E： 高良姜

---

50 、 单选题

药物用规定浓度的乙醇浸出或溶解，或以流浸膏稀释制成的澄明液体制剂为（ ）

A： 浸膏剂

B： 药酒

C： 酊剂

D： 糖浆剂

E： 煎膏剂

---

51 、 单选题

常用渗漉法制备，且需先收集药材量85%初漉液的剂型是（ ）

A： 药酒

B： 流浸膏剂

C： 煎膏剂

D： 浸膏剂

E： 酊剂

---

52 、 单选题

跌打丸的功能是（ ）

A： 活血散瘀，消肿止痛

B： 活血化瘀，接骨续筋

C： 舒经活络，活血止痛

D： 化瘀消肿，止痛止血

E： 化瘀止血，活血止痛

---

53 、 单选题

流浸膏剂常用的制备方法是（ ）

A： 煎煮法

B： 渗漉法

C： 回流法

D： 浸渍法

E： 蒸馏法

---

54 、 单选题

麻黄配石膏共同体现的功效是（ ）

A： 利水消肿

B： 发汗解表

C： 清热泻火

D： 调和营卫

E： 清肺平喘

---

55 、 单选题

决定溶胶溶液稳定性的主要因素是（ ）

A： pH

B： 吸附作用

C： 离子化作用

D： 电位差

E： 水化作用

---

56 、 单选题

细辛内服入汤剂的剂量是（ ）

A： 30 ~ 60g

B： 1 ~ 3g

C： 0.5 ~ 1g

D： 6 ~ 12g

E： 12 ~ 30g

---

57 、 单选题

药剂上认为产生致热能力最强的热原微生物是（ ）

A： 革兰阳性杆菌

B： 沙门杆菌

C： 革兰阴性杆菌

D： 金黄色葡萄球菌

E： 绿脓杆菌

---

58 、 单选题

木通不具有的功效是（ ）

A： 利水通淋

B： 泄热

C： 下乳

D： 通经

E： 通便

---

59 、 单选题

酸味药所含鞣质的主要药理作用是（ ）

A： 降低血压

B： 镇咳、祛痰

C： 利尿消肿

D： 镇静

E： 止泻、止血

---

60 、 单选题

毒性表现以损害机体肝肾功能及内分泌系统功能为常见的不良反应是（ ）

A： 变态反应

B： 副作用

C： 急性毒性反应

D： 特殊毒性反应

E： 长期毒性反应

---

61 、 单选题

既助消化，又抑制催乳素分泌的药物是（ ）

A： 神曲

B： 稻芽

C： 鸡内金

D： 山楂

E： 麦芽

---

62 、 单选题

毒蛋白类成分的毒性主要表现是

A： 黏膜刺激、腐蚀，引起内脏出血

B： 兴奋脊髓，抑制呼吸中枢

C： 肝肾毒性

D： 心脏毒性

E： 中枢兴奋

---

63 、 单选题

善治油腻肉积的药物是（ ）

A： 鸡内金

B： 莱菔子

C： 麦芽

D： 山楂

E： 稻芽

---

64 、 单选题

重楼来源于（ ）

A： 百部科

B： 姜科

C： 茜草科

D： 兰科

E： 百合科

---

65 、 单选题

下列对松贝的性状特征描述正确的是（ ）

A： 鳞茎呈类扁球形，外层鳞叶2瓣，大小相近，相对抱合，顶端多开裂

B： 鳞茎呈类圆锥形或近球形，外层鳞叶2瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，顶端闭合，底部平，微凹入

C： 鳞茎扁球形，外层鳞叶2瓣，较大而肥厚，略呈肾形，相互抱合

D： 鳞茎外层单瓣肥厚鳞叶，略呈新月形

E： 鳞茎呈长圆锥形，表面类白色或浅棕黄色，有的具棕色斑点，外层鳞叶大小相近，顶端裂开而略尖

---

66 、 单选题

既能清热化痰，又能清心定惊的药物是（ ）

A： 竹茹

B： 川贝母

C： 瓜蒌

D： 桔梗

E： 天竺黄

---

67 、 单选题

易损害肾脏，肾功效不全者禁用的药物是（ ）

A： 半夏

B： 胖大海

C： 海蛤壳

D： 马兜铃

E： 海浮石

---

68 、 单选题

内含马钱子，切勿过量或持久服用的常用中成药是（ ）

A： 接骨丸

B： 接骨七厘片

C： 舒筋活血片

D： 活血止痛散

E： 跌打丸

---

69 、 单选题

下列易泛油的中药饮片是（ ）

A： 黄芪

B： 白芍

C： 黄柏

D： 大黄

E： 当归

70 、 单选题

以下药材中以块茎入药的是（ ）

A： 泽泻

B： 狗脊

C： 巴戟天

D： 天冬

E： 徐长卿

71 、 单选题

与抗组胺药联用，不能减少西药的用量和嗜睡、口渴等不良反应的是（ ）

A： 真武汤

B： 干姜汤

C： 小青龙汤

D： 柴胡桂枝汤

E： 柴朴汤

72 、 单选题

西洋参的原主产地为（ ）

A： 美国和加拿大

B： 西班牙

C： 韩国

D： 美国和韩国

E： 中国

73 、 单选题

消渴丸中含的西药成分是（ ）

A： 格列本脲

B： 苯甲酸

C： 水杨酸

D： 吲哚美辛

E： 格列苯脲

74 、 单选题

以下关于川芎性状特征描述正确的是（ ）

A： 根茎呈纺锤形，稍扭曲

B： 断面散有黄棕色小油点，可见波状形成层环纹

C： 有浓郁香气，味甘、辛、微苦

D： 表面深褐色，粗糙皱缩

E： 体轻，质硬而脆，易折断

75、 单选题

清燥救肺汤的功用是（ ）

A： 清宣温燥，止咳化痰

B： 养阴润肺，化痰止咳

C： 清燥养阴，益气补肺

D： 滋肾润肺，清热化痰

E： 益气养阴，敛肺止咳

76、 单选题

小金丸含有的有（ ）毒中药材是

A： 草乌

B： 马钱子

C： 朱砂

D： 川乌

E： 红粉

77、 单选题

狭叶番泻叶主产于（ ）

A： 云南

B： 海南

C： 印度

D： 埃及

E： 印度尼西亚

78、 单选题

入药部位为带花果穗的中药材是（ ）

A： 款冬花

B： 望春花

C： 洋金花

D： 丁香

E： 夏枯草

79、 单选题

既可平肝潜阳，又能制酸止痛的是（ ）

A： 石决明

B： 珍珠母

C： 海蛤壳

D： 代赭石

E： 牡蛎

80 、 单选题

果实表面棕红色或红黄色，具有6条翅状纵棱的药材是（ ）

A： 枸杞子

B： 蛇床子

C： 地肤子

D： 栀子

E： 女贞子

81 、 单选题

能引导方中诸药直达病所的药称（ ）

A： 佐助药

B： 佐制药

C： 引经药

D： 臣药

E： 调和药

82 、 单选题

五倍子的主产地有（ ）

A： 广东、广西、福建

B： 东北三省

C： 河南、安徽

D： 青海、甘肃

E： 四川、云南、贵州

83 、 单选题

亲水性生物碱最易溶于（ ）

A： 乙醇

B： 乙醚

C： 二氯甲烷

D： 苯

E： 三氯甲烷

84 、 单选题

下列中药材忌火煅的是（ ）

A： 石膏

B： 炉甘石

C： 赭石

D： 滑石

E： 雄黄

85、 单选题

用雷氏铵盐溶液沉淀生物碱时，最佳条件是（ ）

A： 酸性水溶液

B： 中性水溶液

C： 碱性水溶液

D： 三氯甲烷

E： 95%乙醇溶液

86、 单选题

在炮制处理时宜"忌铁器"的成分是（ ）

A： 鞣质

B： 油脂

C： 生物碱

D： 树脂

E： 挥发油

87、 单选题

极性最大的化合物是（ ）

A： 大黄酸

B： 大黄素

C： 大黄素葡萄糖苷

D： 大黄素甲醚

E： 芦荟大黄素

88、 单选题

姜炙后能缓和苦寒之性，并能增强止呕作用的药物是（ ）

A： 半夏

B： 厚朴

C： 黄连

D： 黄芩

E： 知母

89、 单选题

生狗脊片近外皮1~4mm处有一条凸起的棕黄色环纹是（ ）

A： 形成层

B： 纤维层

C： 木质部

D： 石细胞环带

E： 韧皮部

90 、 单选题

发散风寒，解热止痛的是（ ）

A： 桑菊感冒片

B： 荆防颗粒

C： 参苏丸

D： 正柴胡饮颗粒

E： 双黄连口服液

91 、 单选题

疏风解表，清热解毒的是（ ）

A： 桑菊感冒片

B： 荆防颗粒

C： 参苏丸

D： 正柴胡饮颗粒

E： 双黄连口服液

92 、 单选题

疏散风寒，祛痰止咳的是（ ）

A： 桑菊感冒片

B： 荆防颗粒

C： 参苏丸

D： 正柴胡饮颗粒

E： 双黄连口服液

93 、 单选题

用生姜和白矾炮制的是（ ）

A： 巴豆

B： 生南星

C： 法半夏

D： 姜半夏

E： 清半夏

94 、 单选题

经制霜后降低毒性的是（ ）

A： 巴豆

B： 生南星

C： 法半夏

D： 姜半夏

E： 清半夏

95、 单选题

细辛的毒性成分（ ）

A： 大黄酸
B： 马兜铃酸
C： 没食子酸
D： 白桦酸
E： 绿原酸

96、 单选题

金银花的主要有效成分（ ）

A： 大黄酸
B： 马兜铃酸
C： 没食子酸
D： 白桦酸
E： 绿原酸

97、 单选题

肉豆蔻的药用部位是（ ）

A： 种皮
B： 果实
C： 果核
D： 假种皮
E： 种仁

98、 单选题

巴豆的药用部位是（ ）

A： 种皮
B： 果实
C： 果核
D： 假种皮
E： 种仁

99、 单选题

胶剂制备时，用以矫臭的辅料是（ ）

A： 黄酒
B： 明矾
C： 豆油
D： 冰糖
E： 明胶

100 、 单选题

胶剂制备过程中，能降低胶块黏度，起消泡作用的辅料是（ ）

A： 黄酒

B： 明矾

C： 豆油

D： 冰糖

E： 明胶