2021年军队文职人员招聘考试《中医学》真题

1、 单选题

FBG > 9.0mmol/L时为（ ）

A： 高糖血症

B： 尿糖阳性

C： 血糖减低

D： 低糖血症

E： 空腹血糖过高

2、 单选题

足太阳膀胱经在躯干部的循行部位是（ ）

A： 前面

B： 侧面

C： 后背

D： 上部

E： 下部

3、 单选题

患者刘某，男,58岁。平素食少脘痞，大便不实，由于饮食不当时引发哮证，倦怠，气短，语言无力，舌质淡，苔薄腻，脉细软。方药宜选用（ ）

A： 生脉散

B： 六君子汤

C： 香砂六君子汤

D： 补中益气汤

E： 四君子汤

4、 单选题

可引起胆囊肿大、无压痛，伴显著黄疸的疾病是（ ）

A： 胆囊结石

B： 胆总管结石

C： 胆囊炎

D： 胆管炎
E： 胰头癌

5、 单选题

既能治疗前头痛，又善治目疾的腧穴是（ ）
A： 列缺
B： 阳白
C： 昆仑
D： 太阳
E： 悬钟

6、 单选题

患者干咳无痰，胸痛，午后颧红，夜间低热，盗汗，口干咽燥，形体消瘦，脉细数。其典型舌象应是（ ）
A： 舌紫苔黄
B： 舌绛苔黄
C： 舌红少苔
D： 舌红苔黄
E： 舌淡少苔

7、 单选题

治疗慢性泄泻，天枢穴应采用的刺灸法是（ ）
A： 毫针泻法
B： 毫针补法
C： 灸法
D： 平补平泻法
E： 先泻后补法

8、 单选题

引起吸气性呼吸困难的疾病是（ ）
A： 慢性阻塞性肺气肿
B： 支气管哮喘
C： 气胸
D： 大块肺不张
E： 气管受压

9、 单选题

使用糖皮质激素治疗SARS下列哪项不正确（ ）
A： 目的在于抑制异常的免疫病理反应，减轻肺的渗出及损伤
B： 中毒症状重，持续发热，经对症治疗3天以上，体温仍超过38

C： X线胸片示大片阴影并在48小时之内病灶面积增大>50%且在正位胸片上病灶面积占双肺总面积的1／4以上
D： 达到急性肺损伤的诊断标准
E： 出现ARDS

10、 单选题

患者，女性，45岁。失眠2年，经常多梦少寐，入睡迟，易惊醒，平常遇事惊怕，多疑善感，气短头晕，舌淡，脉弦细。治疗除取主穴外，还应加（ ）
A： 心俞、厥阴俞、脾俞
B： 心俞、肾俞、太溪、足三里
C： 心俞、胆俞、大陵、丘墟
D： 肝俞、间使、太冲
E： 脾俞、胃俞、足三里

11、 单选题

急性腹膜炎病人为减轻疾病所致的痛苦，所采取的体位是（ ）
A： 辗转体位
B： 角弓反张位
C： 强迫仰卧位
D： 强迫俯卧位
E： 强迫坐位

12、 单选题

患者X线下见两肺上部有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的疾病为（ ）
A： 肺大泡
B： 肺脓肿
C： 浸润型肺结核空洞形成
D： 慢性纤维空洞型肺结核
E： 周围型肺癌空洞形成

13、 单选题

适宜金匮肾气丸治疗的消渴中医证型是（ ）
A： 肾阴亏虚证
B： 胃热炽盛证
C： 气阴两虚证
D： 肺热津伤证
E： 阴阳两虚证

14、 单选题

沿腹中线旁开5分，胸中线旁开2寸到达锁骨下缘的经脉是（ ）
A： 足厥阴肝经
B： 手太阴肺经
C： 足阳明胃经
D： 足太阴脾经
E： 足少阴肾经

---

15 、 单选题

治疗肾虚腰痛除主穴外应选配穴是（ ）
A： 命门、腰阳关
B： 膈俞、次髎
C： 大肠俞、申脉
D： 后溪、委中
E： 肾俞、太溪

---

16 、 单选题

雄激素最适合治疗（ ）
A： 缺铁性贫血
B： 海洋性贫血
C： 慢性感染性贫血
D： 铁粒幼红细胞贫血
E： 再生障碍性贫血

---

17 、 单选题

若痢疾初起，兼见表证，恶寒发热、头痛身重者，首选的方剂是（ ）
A： 芍药汤
B： 白头翁汤
C： 不换金正气散
D： 《活人》败毒散
E： 香连丸

---

18 、 单选题

患者腰膝痠软，耳鸣头昏，小便频数而清，尿后余沥不尽，夜尿频多，舌淡，脉弱。其证候是（ ）
A： 肾气不固
B： 肾阳虚损
C： 肝肾阴虚
D： 肾精亏虚
E： 肾阴虚亏

---

19 、 单选题

治疗痰气郁结之癫证，应首选（ ）

A： 癫狂梦醒汤

B： 生铁落饮

C： 逍遥散合顺气导痰汤

D： 琥珀养心丹

E： 养心汤合越鞠丸

---

20 、 单选题

在经络系统中，具有离、入、出、合循行特点的是（ ）

A： 奇经八脉

B： 十二经别

C： 十二经筋

D： 十二皮部

E： 十五络脉

---

21 、 单选题

治疗胸痹心血瘀阻证的代表方剂是（ ）

A： 生脉饮

B： 瓜篓薤白白酒汤

C： 血府逐瘀汤

D： 瓜蒌薤白半夏汤

E： 苏合香丸

---

22 、 单选题

医生向病人提供的信息应符合下列条件（ ）

A： 正确、适量、适度、理解、开导

B： 正确、如实、全部、理解、开导

C： 准确、如实、全部、理解、指导

D： 正确、如实、适度、理解、诱导

E： 如实、全部、理解、开导、适度

---

23 、 单选题

一患者受凉后咳嗽、高热、咳铁锈色痰，胸痛，随呼吸运动而加重，屏住呼吸时减轻。此患者在听诊时最易出现的体征为下列哪一项（ ）

A： 哮鸣音

B： 鼾音

C： 胸膜摩擦音

D： 捻发音

E： 哨笛音

---

24 、 单选题

腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱桡侧凹陷中的腧穴是（ ）

A： 神门

B： 大陵

C： 列缺

D： 太渊

E： 内关

---

25 、 单选题

病人胁肋胀痛，走窜不定，疼痛随情志的变化而增减，胸闷不舒，饮食减少，暖气频作，苔薄，脉弦。辨证属何类型胁痛（ ）

A： 瘀血停着

B： 肝郁化火

C： 肝郁气滞

D： 肝胆湿热

E： 肝阴不足

---

26 、 单选题

在同班同学患甲型肝炎后，对一10岁小儿检查发现，血清抗-HAVIgM阳性，肝功正常。此种情况属（ ）

A： 显性感染

B： 隐性感染

C： 潜在性感染

D： 病原携带

E： 易感者

---

27 、 单选题

以小腹胀满疼痛，小便涩滞淋沥不尽为特征的病证是（ ）

A： 热淋

B： 血淋

C： 石淋

D： 气淋

E： 劳淋

---

28 、 单选题

传染病暴发流行时，经省级政府决定对疫区实行封锁措施，此类传染病的类别和处理措施，属于（ ）

A： 甲类……紧急措施

B： 乙类……紧急措施

C： 甲类……特殊措施

D： 乙类……特殊措施

E： 乙类……一般措施

---

29 、 单选题

患者，头痛而胀，甚则头胀如裂，发热或恶风，面红目赤，口渴喜饮，大便不畅，溲赤便秘，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。宜选用（ ）

A： 半夏白术汤
B： 天麻钩藤饮
C： 通窍活血汤
D： 芎芷石膏汤
E： 川芎茶调散

---

30 、 单选题

患儿，4岁。高热3天，伴呕吐。查体：全身皮肤散在出血点，颈项强直，克氏征阳性。应首先考虑的是（ ）

A： 伤寒
B： 流行性脑脊髓膜炎
C： 中毒性菌痢
D： 流行性乙型脑炎
E： 化脓性脑膜炎

---

31 、 单选题

治疗盗汗或热病汗不出的腧穴是（ ）

A： 大椎
B： 风池
C： 复溜
D： 太溪
E： 合谷

---

32 、 单选题

心痛患者，心痛彻背，背痛彻心，气短心悸，感寒痛甚，四肢不温，冷汗出，舌苔薄白，脉紧。其证候是（ ）

A： 痰浊痹阻
B： 寒凝心脉
C： 气滞血瘀
D： 气阴两虚
E： 心肾阳虚

---

33 、 单选题

提插补泻法中，泻法的操作手法是（ ）

A： 重插轻提，幅度大，频率快

B： 重插轻提，幅度小，频率快
C： 重插轻提，幅度小，频率慢
D： 轻插重提，幅度小，频率快
E： 轻插重提，幅度大，频率快

---

34 、 单选题

患者，男，41岁，养鸡专业户。两天来体温39 ，伴随鼻塞、流涕、咳嗽咽痛，体征可见眼结膜轻度充血，咽部充血，肺部有干啰音，疑为人感染高致病性禽流感。应做何种检查进行确诊（ ）
A： 血常规
B： 血生化
C： X线
D： CT
E： 呼吸道标本病毒分离

---

35 、 单选题

关于肠胃型和蠕动波不正确的是（ ）
A： 胃蠕动波自右向左为逆蠕动波
B： 结肠远端梗阻肠型多位于腹部周边
C： 小肠梗阻所致的蠕动波多见于中腹部
D： 如发生肠麻痹，则蠕动波消失
E： 严重的肠梗阻可呈多层梯型肠型，蠕动波运行方向一致

---

36 、 单选题

治疗不寐痰热内扰证，应首选（ ）
A： 温胆汤
B： 朱砂安神丸
C： 安神定志丸
D： 黄连阿胶汤
E： 甘麦大枣汤

---

37 、 单选题

与石淋的发病关系最为密切的病机是（ ）
A： 脾虚中气下陷
B： 肾虚下元不固
C： 湿热蕴结下焦
D： 热盛迫血妄行
E： 气郁化火伤阴

---

38 、 单选题

某患者受冷风吹面后，次日晨起发现口角流涎。查体：一侧眼裂较大，不能皱额，鼻唇沟变浅，口角下垂。应首先考虑诊断为（ ）
A： 蛛网膜下隙出血
B： 脑瘤
C： 脑梗死
D： 脑出血
E： 周围性面神经麻痹

---

39 、 单选题

患者呃声洪亮，冲逆而出，口臭烦渴喜冷饮，小便短赤，大便秘结，舌苔黄，脉滑数。其治法是（ ）
A： 清胃化痰止呃
B： 清热化湿降逆
C： 清热化瘀止呃
D： 清胃平肝降逆
E： 清降泻热止呃

---

40 、单选题

患者，女，57岁。高血压病史10余年。因情绪激动后剧烈头痛，面色潮红，烦躁不安，恶心呕吐，心悸，汗出，视物模糊。查体：（ ）BP265/135mmHg，心率118次 / 分。诊断为
A： 恶性高血压
B： 高血压危象
C： 单纯收缩期高血压
D： 高血压脑病
E： 高血压三期

---

41 、 单选题

首选用于治疗热性哮喘的方剂是（ ）
A： 二陈汤
B： 三拗汤
C： 大青龙汤
D： 麻杏石甘汤
E： 小青龙汤

---

42 、 单选题

首选用于治疗寒性哮喘的方剂是（ ）
A： 二陈汤
B： 三拗汤
C： 大青龙汤
D： 麻杏石甘汤
E： 小青龙汤

43 、 单选题

乳岩肝郁痰凝证，内治应首选（ ）

A： 右归丸

B： 二仙汤

C： 瓜蒌牛蒡汤

D： 逍遥蒌贝散

E： 神效瓜蒌散

44 、 单选题

乳腺增生病冲任失调证，内治应首选（ ）

A： 右归丸

B： 二仙汤

C： 瓜蒌牛蒡汤

D： 逍遥蒌贝散

E： 神效瓜蒌散

45 、 单选题

阴痒之肝肾阴虚证的代表方是（ ）

A： 逍遥散

B： 知柏地黄丸

C： 四逆散

D： 龙胆泻肝汤

E： 以上都不是

46 、 单选题

治疗阴痒之肝经湿热证的代表方是（ ）

A： 逍遥散

B： 知柏地黄丸

C： 四逆散

D： 龙胆泻肝汤

E： 以上都不是

47 、 单选题

月经周期提前，量较多，色深红，质黏稠，两颧潮红，手足心热，应选方（ ）

A： 清经散

B： 龙胆泻肝汤

C： 清热固经汤

D： 两地汤

E： 固阴煎

48 、 单选题

经来先后无定，量少色淡，头晕耳鸣，腰骶酸软，应选方（ ）

A： 清经散

B： 龙胆泻肝汤

C： 清热固经汤

D： 两地汤

E： 固阴煎

49 、 单选题

胃下垂、脱肛、子宫下垂等疾病，临床上均可采用升提中气法治疗，体现了（ ）

A： 辨病论治

B： 同病异治

C： 异病同治

D： 因地制宜

E： 因人制宜

50 、 单选题

同一疾病，在治疗过程中，由于疾病发生的时间、地域、年龄、体质等因素而采用不同的治疗方法，体现了（ ）

A： 辨病论治

B： 同病异治

C： 异病同治

D： 因地制宜

E： 因人制宜